

目次

辨太陽病脈證并治法上	一
辨太陽病脈證并治法中	七
辨太陽病脈證并治法下	二七
辨陽明病脈證并治法	四〇
辨少陽病脈證并治法	五五
辨太陰病脈證并治法	五六
辨少陰病脈證并治法	五八
辨厥陰病脈證并治法	六五

傷寒論綱要

橘南谿述

辨太陽病脈證并治法上

陽氣實人。偶感風寒。其邪氣在表者。名曰太陽病。

太陽之爲病。脈浮。

邪氣在表。陽氣在裏。則使脈浮。

頭項強痛。

表有邪氣。陽氣不得宣布。乃升頭項。而項亦已有邪氣。故相迫作痛也。項於身體。而

爲最狹隘處。陽氣易充塞。故作強也。

而惡寒。

邪氣固表。陽氣不布。因惡寒。此太陽證。故括而字。以示非少陰本分之惡寒也。○此章爲太陽之綱也。陽氣實人感風寒。其邪在表。則必見此脈證。通卷稱太陽病者。皆含此一章。

○太陽病發熱。

陽氣漸積成熱而發。

汗出。

邪氣在肌。陽氣不能復護腠理。故汗出。

惡風。脈

緩者。

邪氣本薄。陽氣拂鬱不甚。脈是以不愈。

名爲中風。

中者至也。風寒邪從外而入。至胃而止。猶矢之至的也。風曰中者。風邪本薄。力不足入胃。故以太陽爲中。其

風寒異言者。爲示邪之厚薄耳。通卷稱中風者。皆含此一章。

○太陽病。或已發熱。

陽氣盛實。成熱速。能即發熱。

或未發熱。

雖陽氣

氣厚。故不

必惡寒。

邪氣在表。則不論陽氣之盛實。邪氣之厚薄。皆先惡寒。體痛邪厚故不獨頭項能即發熱。寒所以熱曰已未寒曰必也。○不風寒者。邪厚也。體痛邪厚故不獨頭項

廣闊處。亦血

脈陰陽。

脈之爲實。陰血也。使之鼓動者陽氣也。陰陽相得。脈氣不易行。由胃管。乃行。本論所稱。脈之陰陽者。蓋指陰血與陽氣也。

俱緊者。

邪厚。氣血俱所束。

名曰傷寒。

傷者損也。風寒邪從外而入。至胃而止。邪之所歷。必傷損。寒曰傷者。寒邪本厚。法當入胃。故太陽曰傷。至陽明而後爲

中。○此二章爲目也。而以別邪之厚薄。通卷稱傷寒者。皆含此一章。

○傷寒一日太陽受之。

此等證。頗與本論通。雖使人誤解也。論中問有之。然玉石

自有別。不必

脈若靜者。爲不傳。煩欲吐。若煩燥。脈數急者。爲傳也。○傷寒二

三日。陽明少陽證不見者。爲不傳也。○太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫

病。溫病元見證如此矣。然溫病。故姑舍不論。若兼中風。則見脈陰陽以下證。是太陽中風。而不可汗之。又不可下之火之者何也。蓋太陽與少陽之合病。治從少陽法也。雖俱是風寒邪。而

不可汗下。況於若發汗已身灼熱者。桂枝麻黃雖能除表邪。而其辛溫又觸動溫邪。名曰風溫。中風兼溫病者。風溫

爲病。脈陰陽俱浮。陽脈浮。以中風。陰脈浮。以溫邪。自汗出。中風身重。溫邪在深。皆筋氣不利。多眠睡。大表三焦各有邪。

故陽氣閉藏。鼻息必鼾。邪氣外塞。陽氣內滿。呼吸之氣。溢于唇門。語言難出。口筋亦不利。若被下者。小便不利。

陽氣虛。其力不足。游邪。推勝脫。直視。津液虛。邪乘之。心下通迫。眼系因急。失渡。膀胱失衛護。若被火者。火攻。取汗過多。微發黃色。劇

微劇及。則如驚癇。火熱煎耗心血。故神不得安舍。時瘈瘲。燥及筋絡。陽氣偏行。若火熏之。黃色益是。似火熏之。一逆尚引

日。再逆促命期。○病。病有三陰之辭。有發熱。陽實。人有邪。則陽積而成熱。能自發。惡寒者。發於陽

也。所謂陽病。陽虛人。雖有邪。而陽不足成熱。惡寒者。發於陰也。所謂陰病。發於陽者。七日愈。發於

陰者。六日愈。以陽數七。陰數六故也。陰也之下二十三字。蓋後人誤解本論之文。○太陽病。頭痛。太陽經絡

項。故後人至七日已上自愈者。以行其經盡故也。若欲作再經者。鍼足陽明。

使經不傳則愈。○太陽病欲解時。從巳至未上。是。給解亦

○風家表解而不了了者。十二日愈。○病人。疑似之證。竊其理。而屬之於本篇者。皆稱病人。身大熱。反

欲得近衣者。熱在皮膚。寒在骨髓也。身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱

在骨髓也。○太陽中風。陽浮而陰弱。邪氣分。陽氣微。其脈乃浮。邪不及血分。經血運行。其脈乃微。蓋弱非虛弱之謂也。但此

陽脈帶邪者。自見有強弱之差。陽浮者。熱自發。浮以知陽。實于裏。陰弱者。汗自出。弱以知邪。不束血分。齎齎惡寒。漸漸

惡風。翕翕發熱。鼻鳴。呼吸獨喘。以作聲。乾嘔者。桂枝湯主之。主君主也。已君主此服證。則制治之仕在此方。而非它方所桂枝湯方。桂枝湯。桂枝。芍藥。甘草。生津液。此方芍藥配桂枝。聚津液于表。以供與邪而

方皆此 桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩 大棗 十二枚 右五味以水七升。

微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已。須臾飲熱稀粥一升餘。以助藥

力。溫覆令一時許。遍身熱。熱者曰發。微似有汗者。益佳。不可令如水流

漓。病必不除。陽氣充表。寒邪乃去。若服法太急。則汗出如水。病必不除。若一服汗出。病差停

後服。不必盡劑。若不汗。更服。依前法。又不汗。後服小促。促其間半日許。令

三服盡。誤以爲病重。而服一升。不汗者。再三服至若病重者。一日一夜服。周時觀

之。桂枝湯。若初知病重。則盡一劑。而問發否。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二

三劑。禁生冷。粘滑肉麵。五辛酒酪。臭惡等物。忌制藥○太陽病。頭痛發熱。汗

出惡風者。桂枝湯主之。此章舉桂枝湯主證。以總括前章。因卷方後之章多用此例。○太陽病。項背強几几。葛根

反汗出惡風者。桂枝湯主之。桂枝湯證。各於本條下注之。桂枝加葛根湯主之。○太陽病。下之後。其氣

上衝者。表證被下。裏陽益不能固。因上衝。是下後。邪猶圍表故也。可與雖似非主證。然其藥證足治其病者曰可。○或

所當任而不可他藥者。曰與。此等皆用字之常例。桂枝湯方。雖見他證。而但見下。虛用前

法。若不上衝者。邪去本位。裏虛邪因入則非○太陽病三日。已發汗。太陽日數。

若吐若下若溫鍼。仍不解者。此爲壞病。桂枝不中與也。觀其脈證。知犯何

逆。隨證治之。用梔子豉湯乾姜附子湯四逆湯之類是也。○桂枝本爲解肌。若其人其病當無其證。而有之者。皆必加其人二字以應上

下文。脈浮緊。發熱汗不出者。不可與也。常須識此。勿令誤也。邪連及血分者。若發

脈。用桂枝湯則不惟病不

除。其熱。○若酒客病。不可與桂枝湯。得湯則嘔。以酒客不喜甘故也。凡病不重者。不強必益甚。

○喘家。家謂固有喘疾之人。作桂枝湯。加厚朴杏子佳。藥力不安於胃。則不得其辛溫達至肺成膿血。本論之法為然矣。

○凡服桂枝湯吐者。其後必吐膿血也。經絡有鬱滯之人。當服行氣順血陳腫開散等之藥者。而倒感風寒。故服桂枝湯。而推陽則前塞後挫。不得不吐。而其辛溫達至肺成膿血。

○太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。從表而取。故惡風。小便難。津液亦不得自由。尿因難通利。

四肢微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。助表陽以引津液。

太陽病。下之後。脈促。裏陰傾虛。陽氣急拒邪於表。則其脈見浮數中時一止。胸滿者。裏陽失所依。欲出表。而表發有邪。故胸滿。桂枝

去芍藥湯主之。裏下後。胃氣易動。若用芍藥。則恐津液先聚于裏而更下利。若微惡寒者。從裏而虛。故惡寒。去芍藥方

中加附子湯主之。○太陽病。得之八九日。中風八九日法當愈。亦當罷勞。如瘧狀。邪近于裏。發熱惡寒。熱多寒少。陽復。其人不嘔。少陽。清便欲自可。裏亦和。一二三度發。邪漸

惡寒。熱多寒少。陽復。其人不嘔。少陽。清便欲自可。裏亦和。一二三度發。邪漸

脈微緩者。雖邪已除。而其人亦罷勞。為欲愈也。脈微而惡寒者。已無表邪。而惡寒者虛也。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。中風八九日法當愈。而反有熱色者。以

其不能得小汗出身必痒。初發汗。汗出不徹。出不得。宜。雖非主方。而後時宜。桂枝麻黃各半湯。

○太陽病。初服桂枝湯。反煩。陽氣重。故也。不解者。本證發。先刺風池。風府。二穴俱在頭項。刺之瀉陽氣所聚。

○服桂枝湯。大汗出。不得服。法。脈洪大者。津液使亡。邪氣漸進。經脈陽盛。故脈洪大。與桂枝湯如前法。若形如瘧。日再發者。因虛邪入榮。汗出必解。發清解。故宜桂枝一二麻黃一湯。

○此章比八九日章。其邪較深矣。而至用藥。則反發。解。發清解。故宜桂枝一二麻黃一湯。

此章比八九日章。其邪較深矣。而至用藥。則反發。解。發清解。故宜桂枝一二麻黃一湯。

此章比八九日章。其邪較深矣。而至用藥。則反發。解。發清解。故宜桂枝一二麻黃一湯。

服桂枝湯。大汗出。後大煩渴。津液亡。陽氣不得。建表。胃中亦為熱。不解。脈洪大者。白虎加入參。

湯主之。陰虛陽實。甚於前章。故以白虎殺其熱。以人參助其陰。陰陽得相和。而發越則邪亦解。○太陽病。發熱惡寒。熱多寒少。

此章與八九日章相發熱多寒少。彼陽新復。邪漸衰。此邪漸入陽漸出。證同因異。脈微弱者。此無陽也。是脈當洪大。而反見微弱者。以陽氣微故也。不審亡陽者。此人不可發汗。中風邪微者。前章皆借麻而自然者故也。

不可發汗。黃以發汗。故有此戒。

宜桂枝二越婢一湯方。邪繫太陽。所以主用桂枝也。邪深一等。故合用麻黃。然無陽人。汗出恐更表虛。今合越婢湯者。以其方中有石膏。雖麻黃浮越性。不至敢傷表也。

桂枝二越婢一湯方。外臺婢作婢。今從之。凡麻黃配桂枝。則疎開表分腠理。記石蜜。則疎開裏分腠理。今越婢湯。則以麻黃配石膏。豈是所以發越脾氣之方也。

桂枝芍藥甘草湯。各十生薑一兩大棗四枚麻黃十八石膏二十右柒味。咀以五升水。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。本方當裁為越婢湯。桂枝湯合飲一升。今合為一方。桂枝二越婢一。○服桂枝湯。

葛根湯症。而微兼水者也。若誤用桂枝湯。則邪不解。反令裏氣鬱水升。乃與下後蓄水者同治法。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。葛根湯心下滿。陽氣鬱微痛。陽氣鬱小便不利者。以小便不利者。桂枝去桂。

加茯苓白朮湯主之。仍桂枝所主。故不削桂枝之名。然姑去桂枝者。桂枝善推裏陽。今若使裏陽散于裏而令陽氣內守也。若其裏陽散水升。則必增心下滿微痛症。故去桂枝。但反獨不去芍藥者。欲聚津液于裏而令陽氣內守也。○傷寒。此本傷寒。經日久施治數。正邪俱衰。其證似中風。邪則水飲去。而後治之。必奏效。

其治已盡桂枝。故第次於此。適卷章連須成義。不獨此章為然。學者若能尋諸次之意。思過半矣。脈浮。浮邪仍在表也。自汗出。小便數。皆氣虛也。心煩。虛煩。微惡寒。陽氣虛。腳攣急。津液虛。反與桂枝湯。欲攻其表。此誤也。桂枝加附子湯。

得之便厥。表虛人。若得桂枝湯。而汗出陽亡。則益虛而厥。咽中乾。津液虛。煩燥。吐逆者。煩燥是表裏俱乾。吐逆裏陽。

壹衝咽而升也。作甘草乾姜湯與之。以復其陽。凡表裏俱虛者。先救裏法也。若厥愈足溫者。更作芍

藥甘草湯與之。救陰。其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。胃中一燥。已結燥屎。則陰陽雖始復。而不得即和也。

其譫語者。有燥屎故陽氣不得還胃中。盜胸成熱。而燒肺心血。神乃不得正也。於是此湯下燥屎。則陽氣得還胃中。胸中熱平。譫語乃止。少與調胃承氣湯。若

重發汗。復加燒鍼者。四逆湯主之。與桂枝湯。見諸證加。向不覺是從虛來。誤以爲病進。而復與麻黃湯。或加燒鍼。益大虛。致危者。非甘草乾姜湯所能救。

甘草乾姜湯方。甘草救陰。甘草助陽。甘草四兩乾姜二兩右以水三升。煮取

一升五合。去滓。分溫再服。芍藥甘草湯方。白芍藥四兩甘草四兩右二味。以

咀以水三升。煮取一升半。去滓。分溫再服。調胃承氣湯方。大黃利大便。芒硝碎。燥結。甘草緩胃。凡

邪氣除後。腸胃乾燥津液未復者。以此湯下。腸胃焦熱。是所以名調胃也。大黃四兩甘草二兩芒硝半斤右三味。以水

三升。煮取一升。去滓。內芒硝。更上火。微煮令沸。少少溫服。數服少服。日少少。四逆湯

方。甘草二兩乾姜一兩附子一枚右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。

強人可大附子一枚。乾姜三兩。○問曰。穀問者。皆後人解本論之文。證象陽。且

按法治之。法即本論法。而增劇厥逆。咽中乾。兩脰拘急而譫語。師曰。言夜半手足

當溫。兩脚當伸。後如師言。何以知此。答曰。寸口脈浮而大。浮則爲風。傷寒邪

爲中風。大則爲虛。以發汗過多。故津液乾。裏虛偏依經脈。風則生微熱。虛則兩脰攣。病證象桂枝

因加附子參其間。增桂令汗出。附子溫經。亡陽故也。亡陽人。餘邪微存者。當以桂枝加附子湯。參桂枝加桂

湯間。而治之也。若前證所論。醫誤用桂枝湯。重發汗。則雖餘邪盡除。而正氣大虛。半致厥逆。咽中乾。煩燥吐逆等證。如此則不得不用甘草乾姜湯以下之。厥逆。咽中乾。煩

燥。煩燥。吐逆等證。如此則不得不用甘草乾姜湯以下之。

燥陽明內結。譫語煩亂。更飲甘草乾姜湯。夜半陽氣還。兩足當熱。脛尚微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脛伸。以承氣湯微瀉。則止其譫語。故知病可愈。

辨太陽病脈證并治法中

上篇論輕症。中篇論重症。下篇論變症。此三篇之大意也。其輕亦間有轉者。以或斯處或誤治。故引而致之。也。非能自轉焉。故陽明本分。有中寒而無中風。

太陽病。項背強几几。

項強頸不強。是邪易入於陽氣所背。而難入於所向也。發惡寒者必先背。惡熱者必先胸。是陽氣有向背故也。

無汗惡風。

無汗之下。若不插而字。直曰惡寒。則疑少陰。故無汗者。反曰惡風。有汗者反曰惡寒。而明三陽之惡風惡寒皆因邪而作。

葛根湯主之。葛根湯方。葛根四兩。麻黃二兩。桂枝二兩。芍藥二兩。甘草二兩。生薑三兩。大棗十二枚。

右七味。以水一斗。先煮麻黃葛根減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。去

滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啖粥。餘如桂枝法。將息。及禁忌。葛根湯方。葛根四兩。麻黃二兩。桂枝二兩。芍藥二兩。甘草二兩。生薑三兩。大棗十二枚。

黃湯大青龍湯。以葛根杏仁石蜜三物。各配桂枝。以蠶絲其得越性。令其能到各處。而除其邪焉。蓋客邪有淺深之差。則配藥有輕重之別。論中諸方。往往然矣。葛根一味。非曰其治項背強之性也。

○太陽與陽明合病者。必自下利。表裏有邪氣。陽氣無處於。故別取路於大腸。葛根湯主之。病下有者。下利。

無者字。乃知此太陽與陽明合病之正症也。葛根湯并發二陽邪。○太陽與陽明合病。不下利但嘔者。此加者字。前章之意益分明。

葛根加半夏湯主之。葛根加半夏湯方。葛根四兩。麻黃二兩。生薑三兩。甘草二兩。芍藥二兩。桂枝二兩。大棗十二枚。半夏半升。右八味。以水一斗。

先煮葛根麻黃減二升。去白沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微

汗。不須啖粥。餘如桂枝法。將息。及禁忌。

似汗。○太陽病。桂枝證。

若麻黃症。則其變必不止此。

醫反下之利遂不止。

以下二脈促者。表

未解也。

此則桂枝去芍藥傷之症也。

喘。

邪雖薄而入於胃。故裏面腹理。氣息難施。利。遂至喘。

而汗出者。

雖至于喘。而榮氣反和者。邪元薄已通血

分故。葛根黃連黃芩湯主之。

此章下之後。利遂不止。而變者。是蓋與病發於陰。反下之因作痞者。其理相近。故本瀉心湯而立方。

葛根黃

連黃芩湯方。

其連苦寒之性。瀉心下令陽氣達於中焦。葛根性涼。微瀉胸中上衝之陽氣。令其達於上焦。甘草和胃生津。下後邪進而熱氣不能隨身散者。則用麻黃杏仁甘草

石。葛根

半斤

甘草

二兩

黃芩

二兩

黃連

三兩

右四味。

以水八升。先煮葛根減二

升。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫再服。○太陽病。頭痛。

項強。身疼腰

痛。骨節疼痛。

惡風無汗。

邪厚故血分亦為邪所束。

而喘者。

表邪厚。陽鬱甚。津液為稠結。故裏面腹理閉塞。氣息難利。

麻黃湯主之。麻黃湯方。

杏仁麻黃。黃令其四連。

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

二兩

杏仁

七十

右四味。以

水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆

取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。○太陽與陽明合病。喘。

喘。理同麻黃湯。

胸滿者。

邪實于裏。裏陽欲出於胸而連于表。而令表亦有邪。故不能出而胸滿。

不可下。

若下之則表邪入裏。

宜麻黃湯。

是合病用太陽之藥。故曰宜。是傷寒之邪。故曰主之。

○太陽病十日以去。

以經日久。其邪有漸表者。或有漸裏者。或有不轉陽明少陰耳。

已解也。

內虛未復。故。設胸滿脇痛者。邪漸進。而塞上二焦。與小柴胡湯。脈但浮

者。與麻黃湯。

脈浮細者。外已解也。脈浮細者。屬少陽也。若脈但浮而不帶細。且太陽之症。過十日猶不罷者。雖後。亦與麻黃湯。

○太陽中風。脈

浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出。

以經日久。邪氣漸進。而煩躁者。初自汗出。津液虛。故表

加。故脈症俱傷寒。

陽益。而作煩。煩之。大青龍湯主之。若脈微弱。桂枝二兩。一錢。汗出惡風者。虛。不可

服。服之則厥逆。陽氣益。筋惕肉瞤。此為逆也。大青龍湯方。倍麻黃者。以表發。益虛。此為逆也。發表方中。

更加石羔者。以用麻黃多。且其邪深。裏陽虛弱甚故也。○四神益虛。此為逆也。發表方中。名義。麻黃膏。大棗朱。石羔白。附子玄。各取於四方之色。

杏仁四十個。生薑三兩。大棗十二枚。石羔大如雞子。右七味。以水九升。先煮麻黃減二升。

去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉粉之。

溫粉米粉也。後世方書載。溫粉方。恐非張氏書。一服汗者。停後服。汗多亡陽。遂虛。惡風煩躁。虛。不得眠。

也。汗乾矣。附子湯下。○傷寒脈浮緩。身不疼。以經日久。邪氣漸衰。正氣。但重。乍有輕時。邪氣

聚散無常。絡絡寒。則身重。通則輕。無少陰證者。重病經日久。忍其人大虛。況其症似少陰。則補散費藥。故加戒慎。大青龍湯發之。

表邪時發。而入已解。故非大力之藥。則不能取之於表也。蓋邪氣未入胃。雖迂而取之於表法也。但方中。以有石羔。故疑清解。是以特用發字。○傷寒此亦經日。表

不解。以乾嘔發。熱知之。心下有水氣。以咳知。乾嘔。以津液乾燥裏陽難四。發熱。未甚。而咳。邪之所

氣不行。故水氣便停。於是津液難生。氣。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。

或以下。皆水氣之見於症者也。方後加減應之。蓋是後。人之手也。夫治水氣之藥。本方已具之。何更加減焉。小青龍湯主之。小

青龍湯方。桂枝。治表邪。半。麻黃。三兩。芍藥。三兩。五味子。半斤。乾姜。二兩。甘草。三兩。桂枝。三兩。半夏。半升。

細辛。三兩。右八味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去

滓。溫服一升。謹按此方。可以麻黃芍藥甘草桂枝半夏之五物。為本論之據也。柴胡湯與此四。逆散等皆咳者。加五味子乾姜細辛。由此觀之。變此方亦是加三物者。不然則加

減法。其去何獨不及三物哉。然古來以八味為。加減法。若微利者。去麻黃。加薤花。如

子。若渴者。去半夏加栝蒌根三兩。若噎者。去麻黃加附子一枚。若小便不利。少腹滿。去麻黃加茯苓四兩。若喘者。去麻黃加杏仁半升。○傷寒

解三。心下有水氣。咳。而微喘。因邪發熱不渴。心下有水氣。故不欲飲水。服湯。湯小清。已渴

者。水氣去。此寒去欲解也。水氣與邪氣在心下者俱去。而表邪亦欲解也。蓋邪與水氣併者。不可單言水氣。乃兼之曰寒。○太陽病。外證未解。脈浮弱者。當以汗解。宜

桂枝湯。○太陽病。下之微喘者。表未解故也。以誤下故津液使亡。裏陽失所依。欲出表。而表氣有邪。故不能出而鬱。氣息亦隨不利。喘因作。桂枝加厚朴杏仁湯主之。○太陽病。外症

未解者。不可下也。雖有裏證而不可下也。又舉此下之為逆。先治表。欲解外者。宜桂枝湯主之。○太陽病。脈浮者。不愈。雖下之。不

為在外。而反下之。故令不愈。今脈浮。故知在外。當須解外。則愈。○太陽病。脈浮。發熱身疼痛。八九日不

解。以經日久。表證益甚。其人發煩目瞑。表證甚之症。麻黃復治之。故發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。陽症未得發散。麻黃復治之。故曰之重。麻黃湯主之。○太陽病。脈浮緊。發熱身無汗。頭項痛。汗出。故置身字以示唯順有發汗。自汗者愈。其人陽氣元充實。雖不服

○二

路頗寬。其甚痛等諸症微除。其人發煩目瞑。表證甚之症。麻黃復治之。故發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。陽症未得發散。麻黃復治之。故曰之重。麻黃湯主之。○太陽病。脈浮緊。發熱身無汗。頭項痛。汗出。故置身字以示唯順有發汗。自汗者愈。其人陽氣元充實。雖不服

○二

路頗寬。其甚痛等諸症微除。其人發煩目瞑。表證甚之症。麻黃復治之。故發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。陽症未得發散。麻黃復治之。故曰之重。麻黃湯主之。○太陽病。脈浮緊。發熱身無汗。頭項痛。汗出。故置身字以示唯順有發汗。自汗者愈。其人陽氣元充實。雖不服

○二

路頗寬。其甚痛等諸症微除。其人發煩目瞑。表證甚之症。麻黃復治之。故發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。陽症未得發散。麻黃復治之。故曰之重。麻黃湯主之。○太陽病。脈浮緊。發熱身無汗。頭項痛。汗出。故置身字以示唯順有發汗。自汗者愈。其人陽氣元充實。雖不服

○二

路頗寬。其甚痛等諸症微除。其人發煩目瞑。表證甚之症。麻黃復治之。故發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。陽症未得發散。麻黃復治之。故曰之重。麻黃湯主之。○太陽病。脈浮緊。發熱身無汗。頭項痛。汗出。故置身字以示唯順有發汗。自汗者愈。其人陽氣元充實。雖不服

○二

陽併病

表裏俱病。日之合病。表症未全除。裏症又見。日之併病。

太陽初得病時發其汗汗先出

汗先邪而後出。

不徹

因轉屬陽明續自微汗出不惡寒

是陽明之症也。

若太陽病症不罷者續自微汗出不惡寒而太陽病雖仍在者。是併病也。

不可下

雖有陽明症。

下之爲逆如此可小發汗

設面色緣緣正赤

者此未得汗者也。陽氣怫鬱在表當解之熏之

足言陽氣怫鬱不得越。

若發汗不徹

若初發汗者。

雖汗先出不徹而不能使邪盡解。

然不

當汗之症。

而不發汗。則必見其人以下症。此段以結一章義。

其人躁煩

肌表不和。陽氣鬱屈。且以取空汗。故表虛邪因捷。

不知痛處乍在腹

中乍在四肢按之不可得

與體痛同症。

而其邪則傳於體痛者也。其邪無定處者。以邪已傳大表細絡之分故也。

其人短氣但

坐

但坐氣急也。其人新虛。其邪漸入。故令然。

以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以

脈濇故知也

血液虛邪氣入血分。故脈濇也。

○脈浮數者法當汗出而愈若下之身重

心悸者

血液之

不可發汗

若誤下裏虛。而見此症者。不可發汗也。外症未除。故當自汗

出乃解所以然者尺中

以候胃中。

脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出

愈○脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之

麻黃湯。

假令尺中遲者不可發汗

何以知之然以榮氣不足血少故也○脈浮者

其症不瀉。而反汗不出者。

少陰。今以脈浮。知邪在表。

新加

病在表可發汗宜麻黃湯

新加湯章曰脈沉遲。

此章以浮脈沉。次章以數脈浮。

○脈浮而

數者

其有微數脈不可發汗者。故比更加浮字。以明爲太

陽之數。其浮數之問。插而字者。以數應新加湯之變也。

可發汗宜麻黃湯

病之變也。第二章。先治表而後治裏之法。後二章以麻黃取陽裏之邪於表之法。

○病常自汗出者此爲榮氣和

邪不

榮氣和

者外不諧。太表有邪。以衛氣不共榮氣和諧故爾。謂指汗自出。以榮行脈中。故陰以榮於內。

榮衛行脈外。陽氣以衛護外。故復發其汗。榮衛和則愈。宜桂枝湯。○病人藏無

他病。自汗出者。疑係裏。故插此句。時發熱。自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗

則愈。宜桂枝湯主之。○傷寒脈浮緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。○傷

寒不大便六七日。頭痛有熱者。有熱。謂三陽之熱。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。

仍在表也。當須發汗。頭痛有熱。本為太陽症矣。然不大便六七日。且小便色赤者。初二三日亦

然也。其人平素熱。故為兼表者。而先用桂枝湯。○傷寒頭痛者。必衄。謂明當無頭痛。而

得病時。邪氣擾血分。其血鬱而在頭也。如此當見衄。宜桂枝湯。所謂發汗。即桂枝湯也。亦舉方章末

解。已用麻黃湯。半日許復煩。脈浮數者。可更發汗。宜桂枝湯主之。本傷寒。故曰宜。已

曰主之。○凡病。不唯風寒之邪。凡指諸病之辭。若發汗。若吐。若下。若亡津液。亡上若下。陰陽自和者。

若陰陽偏勝者。必自愈。飲食復常。謂得宜。氣血乃復。○大下之後。此章置大字。以下至乾姜附

汗。小便不利者。亡津液故也。勿治之。得小便利。必自愈。陰陽復。津液生。○下之後

復發汗。必振寒。脈微細。所以然者。以內外俱虛故也。○下之後。復發汗。晝

日煩躁。凡人身陽氣之宣布必依陰。今陰陽俱虛。且陰之所主。晝日在裏。不得眠。陰陽俱虛

故陽氣益不能出表。雖于胸中。於是表裏雖無一陽邪。亦煩躁。不得眠。則心虛悸

夜而安靜。陰氣旺于表。陽氣依以伸。不嘔不渴。少陽亦無邪。故裏不復發。無表證。

若表有邪。則脈沉微。以知陰陽虛。身無大熱者。以手試之。身體無溫。謂裏無邪。因知乾姜附子湯

主之。陰陽齊虛者。先助陽則陰隨自復。乾姜附子湯方。此方無甘草者。助裏陽愈故也。若四逆傷。則甘草生緯枝。欲以使裏陽建表也。彼則所愈在表。此則所愈在裏。

乾姜 一兩 附子 一枚 右二味以水三升煮取一升去滓頓服○發汗後

身疼痛脈沉遲者。浮緊者。邪厚之脈也。邪厚則血虛不虛。能致身疼痛。脈沉遲者表邪裏之脈也。雖表邪裏虛。則亦能致身疼痛。故以浮緊者。屬麻黃湯。以沉遲者。屬新

加湯。桂枝加芍藥生薑各一兩。人參 三兩 新加湯主之。煩邪在表。故桂枝主之。血液乾燥。故加芍藥引陰。生

姜鼓舞胃氣行陰。入參生津回陽。○發汗後不可更行桂枝湯。恐益虛。汗出而喘。自汗因出也。發汗所

在。深於前章。故裏面虛。為邪所壅。陽氣鬱。無大熱者。陽氣為邪所阻。不能出。故身熱無汗。可與麻

黃杏仁甘草石膏湯主之。已曰不可行桂枝湯。然而此方似大青龍湯。後世或有以疑更發汗之方。故曰可與。以示其意不在發汗。麻黃杏

仁甘草石膏湯方。麻黃配杏仁石膏。以疎裏面虛。則陽氣宣布。而汗止喘定。凡麻黃

四兩 杏仁 五十個 甘草 二兩 石膏 半斤 右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升。本云黃耳杯。友人關谷士昭曰黃耳杯。當作黃甘

盆。當時此湯之略名耳。○發汗過多。邪解而其人又手自冒心。表虛已甚。陽氣將

滿者。以表不衡。欲得按者。約其器。而後陽氣僅能充焉。故好按者。都為屬虛。桂枝甘草湯主之。桂枝甘草湯

方。甘草發胃而生津液。桂枝推裏陽而建表。此方故表之主劑。後之數方。本此方者多矣。桂枝 四兩 甘草 二兩 右二味以水三升煮

取一升去滓頓服○發汗後其人臍下悸者。表虛故臍下多蓄水。陽氣難行。因臍下氣力不繼。欲作奔

豚。陽氣瀰于水瀰而逆。其狀似豚奔。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。茯苓桂枝甘草大棗湯方。桂

甘草補表。茯苓利膀胱之水。又增甘草。加大棗。賴水。以緩衝逆之氣。

甘草爛水十升。先煮茯苓減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三

服。作甘爛水法。取水二斗。置大盆內。以杓揚之。水上有珠子五六千顆相

逐。取用之。○發汗後。腹脹滿者。胃陽虛弱之人。又發汗津液亡。故胃陽益虛。生水氣。裏陽爲之。不能四布。故腹脹滿。厚朴生

姜甘草半夏人參湯主之。厚朴生薑甘草半夏人參湯方。厚朴泄滿。生薑半夏

人參甘草生津液補表。今用人參。不用桂。裏陽爲水氣所阻。故不欲妄推之也。厚朴半斤生薑半斤半夏半斤人參一兩甘草二兩

右五味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。○傷寒若吐若下後

比車亦發汗後。而心下逆滿。虛陽載水。氣上衝胸。表已虛。又以吐若下。虛其裏。裏陽失所依。且若吐若下者。心下逆滿。而欲出表。而表亦津液已乾燥。故不能四布。

因之上起則頭眩。以胃陽虛。故水飲不化。而留。脈沈邪解。發汗則若誤以爲邪。行。心下。隔陽氣。令不充頭。脈沈邪解發汗則若誤以爲邪

重發汗。動經。津液乾燥者。若發汗。身爲振振搖者。起則頭眩者。已是此湯主症。然不知沉緊。則及血。故動經。身爲振振搖者。起則頭眩者。已是此湯主症。然不知沉緊。是無邪之脈。若誤重發汗。則至動經。動

經微者此湯。扶苓桂枝白朮甘草湯主之。扶苓桂枝白朮甘草湯方。桂枝甘草

水。扶苓桂枝四兩三疑當作四。白朮二兩甘草二兩右四味。以水六升。煮

取三升。去滓。分溫三服。○發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子

湯主之。芍藥甘草附子湯方。芍藥三兩甘草三兩附子一枚已上三味。以水五

升。煮取一升五合。去滓。分溫服。溫字下疑。疑非仲景意。謂去桂。○發汗若下之

病仍不解。煩躁者。陰陽大虛。水虛不行。因用此藥。以利水復陽。此雖扶苓四逆湯主

之。扶苓四逆湯方。扶苓六兩人參一兩甘草二兩乾姜一兩附子一枚右五味。以

水五升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。○發汗後惡寒者。虛故也。邪已解。者。虛令然也。此症正是。不惡寒。但熱者。實也。邪已解。仍熱者。是閉氣壯盛人。當和胃氣。芍藥甘草附子湯所主。

與調胃承氣湯。○太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。少少與飲之。令胃氣和則愈。難胃中乾燥。無燥屎者。若脈浮。表邪仍存。小便不利。不必與調胃承氣湯。

微熱消渴者。發汗過法。津液使乾。表邪未解。自汗仍出。而消渴。與五苓散主之。發汗後。隨飲隨化。遂作留飲。今以此藥利其水。則得津液和。而津液生。渴乃止。凡病人胃中有水。則多渴。蓋水多則胃氣不運。津液無生。咽中爲乾燥。而作渴。乃五苓散利水。則水去。津液生。渴因止。

五苓散方。豬苓十八。澤瀉一兩六錢五分。茯苓十八。桂半兩。白朮十八。右五味。爲末。以桂枝湯除邪。

白飲和服。方寸匕。日三服。多飲暖水。汗出愈。留飲在胃中。故更以暖水。數飲胃陽。且可以助藥力。○發汗已。脈浮數。煩渴者。有水者。五苓散。無水者。白虎加人參湯。以服之。供大停飲。辨之。

五苓散主之。○傷寒。非傷寒。則已。脈浮數。煩渴者。人參湯。以服之。供大停飲。辨之。汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。陽氣微。故不渴。蓋刺症始差。津液虛。陽氣微。而水飲留停。小便不利。故桂枝甘草湯。

扶苓甘草湯主之。扶苓甘草湯方。扶苓二兩。桂枝二兩。生薑三兩。甘草一兩。右四味。以水四升。煮取二升。去滓。分溫三服。○中風發熱。六七日不解而煩。以自汗日久。津液虛。有表裏證。裏有水。渴欲飲水。以自汗日久。津液乾。水入則吐者。名曰水逆。此非關中風。故別命名曰水逆。蓋此人胃陽虛弱。舊有留飲故也。

五苓散主之。○未持脈時。病人手叉自胃心。表虛。師因教試令飲。而不效者。此必兩耳聾無聞也。血液乾燥。神氣不能應鼓膜。所以然者。以重發汗。虛故如此。○發汗後。

飲水多必喘。方津液虛。裏陽不能四布之時。又以水灌之。亦喘。表虛之人。嘗以爲邪仍不解。飲水多。則陽氣所壓。喘因作。

裏陽益鬱。喘因作。○發汗後。水藥不得入口爲逆。津液乾燥者。法當渴。而反不欲水者。治逆也。若更發汗。必

吐下不止。當溫之。而反發汗。故胃中虛冷。發至惡水藥。若重誤則胃氣壞。吐下不止。○發汗吐下後。三法連行。虛煩。虛煩者。煩不因邪也。

○津液虛。且邪圍表則煩。雖無邪而津液大虛。陽氣失所依而難出。則亦煩。皆陽氣屈曲不得伸而令然。不得眠。若劇者。必反覆顛倒。極

心中懊憹。煩極。○懷下無者字可見。其用梔子豉湯。不獨劇者。梔子豉湯主之。梔子豉湯方。梔子十四枚。香豉合。右二味。以水四升。先

煮梔子得二升半。內豉煮取一升半。去滓。分爲二服。溫進一服。懊憹故不欲飲。得吐者止後服。上逆甚。故最惡吐。而更亡其陽。故雖此傷。若或有吐之。則不可強與也。○若少氣者。內外虛懸。元氣不充。梔子甘

草豉湯主之。若嘔者。梔子生薑豉湯主之。深惡其吐。故加生薑耳。○發汗若下之而煩

熱。胸中窒者。梔子豉湯主之。○傷寒五六日。邪氣入少陽。之日數。大下之後。身熱大下

之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。少陽邪未除。裏先虛。邪因入。結心中而痛者。可與此傷也。若太陽傷寒。下之大早。則邪隨

入裏。成結胸。是非大陷胸。則不能治矣。梔子豉湯主之。○傷寒略五六日大下之後七字。下後。心煩腹滿。煩邪侵

臥起不安者。且起且臥。不能寧居。是煩燥甚故也。梔子厚朴湯主之。梔子厚朴湯方。梔子十四枚。厚

朴四兩枳實四枚已上三味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分三服。溫進一

服。得吐者。止後服。○傷寒亦略五六日字。醫以丸藥大下之。丸藥。薑巴豆之丸。身熱不去。微

煩者。以熱藥下之。故裏陽不大虛。梔子乾姜湯主之。煩微。故直加乾姜。梔子乾姜湯方。梔子十四枚。乾姜

十四枚。以水三升半。煮取一升半。去滓。分三服。溫進一服。得吐者。止後服。

二兩右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後

服○凡用梔子湯病人舊微瘧者不可與服之此藥可與下之者而不可與舊瘧者以其為涼藥故也○太

陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動津液大虛陽氣欲行振

振欲擗地者此本桂枝症誤用麻黃邪不解反起水飲之嫌症此皆陽虛所致也○真武

湯主之○咽喉乾燥者咽燥元氣所遺水藥所納最先知津液乾燥不可發汗○淋家下部津液不

可發汗發汗必便血○瘡家有瘡瘍者其血本凝位雖身疼痛血少故不可發汗發汗則

瘡入經毒鼻之出每不可發汗汗出必額上陷取汗則血虛氣虛不能充脈急緊直

視不能瞬目系急亦津液虛涸之故不得眠○亡血家崩漏金瘡吐血諸失血皆謂之亡血家不可發汗發汗

則寒慄而振○汗家重發汗必恍惚心亂心氣乾涸神不得安舍而錯亂小便已陰疼陰中亦

乾燥故小便已覺燥與禹餘糧丸關○病人有寒復發汗本虛者復行虛法此誤也胃中冷必吐衄

○本發汗而復下之此為逆也表症發汗未及愈而牛途生燥下之此逆治也若先發汗治不為逆

表症其發汗非逆治也本先下之而反汗之為逆裏症下之未及愈而牛途生燥反發汗此逆治也若先下之治不

為逆裏症其下之非逆治也○傷寒醫下之續得下利藥力盡而尚續下利者以虛也清穀不止身疼痛

者津液先虛且急當救裏後身疼痛表邪不乘虛直入者清便自調者急當救表

救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○病發熱頭痛脈反沉表病裏症不見而其脈沉者欲愈之候也

救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○病發熱頭痛脈反沉表病裏症不見而其脈沉者欲愈之候也

太陽病。先下之而不愈。因復發汗。以此表裏俱虛。其人因致冒。陰陽大虛。神氣不固。冒

家汗出自愈。津液生。自汗出。則神氣得依以應表。所以然者。汗出表和故也。得裏和。然後復下

之。表裏乾燥。雖生燥尿。而其虛甚。故難卒用下劑。故○太陽病。此章蓋是前章註解。未解。已歷數醫治。而邪

未盡。陰陽脈俱停。停。滯也。停。必先振慄。津液乾燥者。陽氣強出故振。汗出而解。陽氣益能發達。但陽脈微

者。誤汗。衛氣虛。且其邪未盡除。故陽脈微。先汗出而解。津液自和。便。但陰脈微者。誤下。營氣虛。胃下之

而解。除燥尿。則津自生。表邪亦自解。若欲下之。宜調胃承氣湯主之。所急在陰陽俱虛四字。故雖發邪仍存。而不用桂枝湯。唯和胃以

後津液。○太陽病。發熱汗出者。此為榮弱。血分不固。邪。但氣分胃邪。故陽衛強。氣分

邪。故陽氣微。六脈乃浮。是衛則微以強。榮則和以弱者也。故使汗出。欲救邪風者。宜桂枝湯。前二章皆有自汗出而愈者也。此章自若中

風若傷寒變化來者。方見此症。欲偏救邪風者。宜用桂枝湯。蓋此章是表症變化之一大段落。○傷寒五六日。邪入少陽。中風。中風元輕邪。法當不轉陽

明。但以其或新虛或續治。故偶有人陽明。往來寒熱。陽氣伏而肌膚為寒。發而為熱。皆邪令然也。故邪氣客在于太表則惡寒發熱。無有

休時。今邪氣進跨三焦。故伏陽卻越出在太表。其胸脇苦滿。上二焦為邪所塞。陽氣不得出而滿。默默不欲

飲食。中焦不運。胃中所蒸之穀氣。無所施行。故不欲復受食。心煩。會滯汗。且上焦亦閉塞。故煩。喜嘔。中焦不運。陽氣壅滯胃管。或胸中煩而

不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞硬。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。

或欬者。或胸中以下之七症。小與小柴胡湯主之。小柴胡湯方。柴胡清解鬱熱。陳通三焦。令表裏陽氣相通。

黃芩除熱。此人已歷太陽病。故加人參而生津回陽。又加半夏以燥飲者。以血弱氣虛易留飲故也。柴胡半斤黃芩三兩人參三兩甘草二兩半

夏半斤生薑三兩大棗十二枚右七味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。已歷三

復用牛夏以燥津液。取三升。溫服一升。日三服。後加減法。若胸中煩而不嘔。去

半夏人參加栝蒌實一枚。若渴者。去半夏加人參。合前成四兩半。栝蒌根

四兩。若腹中痛者。去黃芩加芍藥三兩。若脇下痞。去大棗加牡蠣四兩。

若心下悸。小便不利者。去黃芩加茯苓四兩。若不渴。外有微熱者。去人參

加桂三兩。溫覆取微汗愈。若欬者。去人參大棗生薑加五味子半升。乾姜

二兩。○血弱氣盡。原太陽之汗。故也。腠理開。邪氣因入。與正氣相搏。結於脇下。表邪將入裏。裏陽

拒之。邪氣乃結于中焦。正邪分爭。往來寒熱。邪氣聚而寒中焦則惡寒。陽氣漸微而破國出則發熱。休作有時。以太表無邪。故熱已發。因

散。則表裏俱無有所病焉。所以有休時也。然而三焦雖有邪。故裏陽漸微。表陽漸消。則復惡寒而發熱焉。故所以有休作時也。默默不欲飲食。藏府相連。

上下藏府面相連屬。其痛必下。邪氣在于上中二焦。則或滿或痛。此所謂邪在于裏。而所痛者。在上下藏府面相連屬。于下也。是以藏府連屬故也。設不連則何有表受邪。而裏有痛者邪。邪

高痛下。故使嘔也。小柴胡湯主之。○服柴胡湯已渴者。屬陽明也。柴胡功成。避三焦已渴。而又見渴者。以其清解之時邪而入胃。胃陽為所困故也。蓋此已歷太陽。又歷少陽。津液虛。故雖微邪。亦能困陽而作渴。以法治之。法。陽明治法也。其先與柴胡湯。治

不渴。○得病。以得病二字起論者。其人六七日。太陽中風經日久。脈遲浮弱。惡風寒。無風

受邪厚。無邪字則變表虛。故手足溫。難虛。而不醫一二三下之不能食。胃氣微。而脇下

滿痛。誤下邪因逆。特加痛者以津液虛故。面目及身黃。陽微故結中風邪。亦頸項強。津液虛。也。插而字者。示其不食不困邪。能使陽氣鬱蒸之。且邪氣在

血分。上焦因虛也。葛根湯章曰項背強。此曰頸項強。自有虛實淺深之異。小便難者。與柴胡湯。此證近陰症。而邪已及三焦。後必

下重。此已屬陰症。而今姑與柴胡湯。清解鬱熱。則胃中益冷將下利。然以已下。故胃中水竭不能

便利。但下重而已。蓋此症用柴胡者不得已也。故去主之二字。以示非主症也。若其下重。

辨太陽病脈證并治法中

邪除而後治之。本渴而飲水嘔者，柴胡湯不中與也。醫之所用。養熱性之丸藥。故雖數下之。而邪不入裏。猶在本位也。但以下之故。胃中乾燥。因渴而飲水多。遂作不食。滿胸發熱。嘔項強。小便難等。諸症者。皆是水飲所為。則五苓散所主。而柴胡湯不中與也。

食穀者噦。下之胃中虛冷。當不能食。若能食者。亦陽微。故不能化之。微陽反為食所抑。因為噦。○傷寒四五日。邪入少陽。身熱。虛者邪雖在三焦。而微陽。惡風。風字是所。以為少。

頸項強。脇下滿。未履下。故無痛。手足溫而渴者。津液乾。裏陽微。小柴胡湯主之。○傷寒

前二章。病在少陽。則不論虛實。而用柴胡湯。此章。示厥症雖似柴胡所主。而邪氣實不及少陽者。異治。陽脈弦。邪在氣。陰脈弦。血之。法當腹

中急痛者。血少者邪又固之。則裏陽益不得出而作急痛。○證字。疑當在弦字下。先與小建中湯。不差者。與小柴胡湯

主之。血液虛則邪雖在太陽。見此脈症。邪在少陽。則血液雖不甚虛。亦或能見此脈症。凡疑似者。其治先從表補。皆法也。小建中湯方。增芍藥甘草加

津液。建中氣。桂枝 三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 芍藥 六兩 生薑 三兩 膠飴 一升 右六味。以

水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不

可用建中湯。以甜故也。○傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。

若太陽病。則其邪所繫。在周身。故見症。種種不可主之以一方也。若少陽病。則其部分在半表半裏。故傷寒中風其邪雖有厚薄。而至三焦狹隘處。則其見症一偏矣。但人虛邪薄者見症少。人實邪厚者見症多。夫柴胡湯善透三焦。開塞者也。故傷寒中風有少陽症者。皆此方所主。而輕者早除。重者晚除耳。非彼太陽之主方。多端之比也。柴胡湯本專則書與主之。服柴胡湯已而渴者。章則書陽明

明也。以法治之。此章則書傷寒中風。但見一症便是。參考此等之言。可以知少陽之部分。柴胡之主治。表裏轉屬之機也。○凡柴胡湯病證而下之。不

反字。而用而字者。病在少陽故也。若柴胡證不罷者。裏證虛邪未入陽明。復與柴胡湯。必蒸蒸而振。却發

熱汗出而解。服柴胡湯。則三焦邪解。陽氣當出。然當歷下。津液乾燥。故欲出不得。其鬱積

氣抑之。勢。蒸蒸乎也。漸而強取。取於三焦則振。振則發熱。其理猶陽氣將發之時有陰

則地。二三。舊虛故其症不劇。二三。心中悸而煩者。裏虛故煩。小

建中藥王云。太陽病過經十餘日。邪氣在太陽。反二三下之。邪氣虛。後四五日。柴

胡證仍在者。未入陽明先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。自胸膈達至心下鬱鬱微煩者。至腹

故煩為未解也。少陽未全解也與大柴胡下之則愈。已日未解。而今用此藥。此藥與前解。故書下之。以示少陽陽明并治。大柴

胡湯方。小柴胡。合小柴胡。承氣之意。柴胡半斤。黃芩三兩。芍藥三兩。半夏半斤。生薑五兩。枳實四枚。大

棗十二枚。右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。升之三升。溫服一升。日

三服。一方用大黃二兩。若不加大黃。恐不為大柴胡湯也。此說是也。○傷寒十

三日。所謂過經。不解。胸脇滿而嘔。是大柴胡症。日晡所發潮熱。邪已去表。裏裏。則裏出表。每過日晡表開之時。乃發而熱。重

本大柴胡湯之症。而誤以巴豆下之。故胃中乾燥。邪因入而作此症。已而微利。此本柴胡證。柴胡湯。謂大柴胡湯。下之而不得利。

已用大柴胡。未得利。今反利者。有潮熱者。法當大便硬也。知醫以丸藥下之。大柴胡湯未及得効。他醫誤自傍私以丸藥下之。非其治

也。當以大黃下之者。反用巴豆。潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。以誤下故致邪氣虛。今復用大柴胡湯重下之。則恐少陽之殘邪乘虛入胃。後以柴胡加芒硝湯主之。方意。似小

故先姑以小柴胡湯全解外。而後用柴胡加芒硝湯。柴胡湯大承氣湯合者。○此症雖有潮熱。而不敢直用承氣者。恐少陽之殘邪也。○傷寒十三日不解。過經。邪雖未入胃。而以經日久。故津液乾燥。至作譫語。

譫語者。以有熱也。有熱。示當以湯下之。若小便利者。陽氣出。大便當硬。

陽氣出表。則津液亦隨出表。而反下利。脈調和者。以脈無虛。故知其下利。非自利。知醫以丸藥下之。非其治

也。津液乾燥者。復以熱藥下之。非其治法也。若自下利者。若小便利。大便又下利者。虛甚也。脈當微厥。今反和者。此為

內實也。以脈察之。無虛寒候。乃知其下利。調胃承氣湯主之。益乾燥。而結燥屎。○

辨太陽病脈證并治法中

太陽病不解。日久不解。邪將從下焦入。熱結膀胱。邪將從下焦入。而陽氣在之。遂積成熱。結膀胱。其人如狂。正邪相拒于下焦。遂入血

室。神因之亂。血自下。下者愈。氣血充實人自能破結。血乃下。邪亦隨去。猶自切而邪解之理也。其外不解者。尚未可攻。

恐外邪乘虛入。當先解外。外解已。但少腹急結者。上二焦已通。下焦獨未通。乃可攻之。宜桃核承氣湯方。

湯方。方字疑衍。桃核承氣湯方。桃仁性下降。能率桂枝至下焦。大黃芒硝下下焦愈結。而陽氣宣暢。邪氣乃解。桃仁五十個桂枝二兩

大黃四兩芒硝二兩甘草二兩右五味。以水七升。煮取二升半。去滓。內芒硝。更

上火微沸。下火先食溫服五合。日三服。當微利。○傷寒八九日下之。未全入

下之。故裏亦虛。胸滿煩驚。津液大虛。裏陽失所故。欲出表。然乾燥甚故不能出。小便不利。讞語。陽氣未能全出表。而反讞語者。乾燥

甚故也。一身盡重。不可轉側者。津液大虛。邪氣又塞。故陽氣難行。柴胡加龍骨牡蠣湯主之。柴胡

加龍骨牡蠣湯方。小柴胡以解少陽之邪。龍骨牡蠣收斂津液。鈹丹鎮驚。桂枝推陽令逆難行之處。扶苓利小便而生津液。大黃瀉熱和胃。○謹按成本有黃芩他本無者

恐脫。今據十齋湯。例考之。方後曰右十一味之。下有大黃。則知上所謂十一味中有黃芩是也。半夏二合大棗六枚柴胡四兩生薑一兩人

參一兩龍骨半斤鈹丹一兩桂枝半斤扶苓半斤大黃二兩牡蠣半斤右十一味。以水

八升。煮取四升。內大黃。切如碁子。更煮一二沸。去滓。溫服一升。○傷寒腹

滿讞語。裏陽未盡出表。故腹滿。傷寒日久而津液乾燥。且邪氣漸入。陽氣漸出。故讞語。寸口脈浮而緊。浮。邪在外陽在內之脈也。緊。血液虛之脈也。插而

字以別太陽傷寒之脈。此肝乘脾也。肝少陽之謂也。脾陽明之謂也。是木乘土。名曰縱。邪自表入裏以刺期門。本

○傷寒發熱。齋齋惡寒。邪在表。大渴欲飲水。其腹必滿。陽氣復而自汗出。小便利。

裏陽回復。陰邪而出表。其病欲解。此肝乘肺也。肺太陽之謂也。是木反乘金。名曰橫。陽氣自裏出表。邪氣退。故曰橫。刺期門。

○太陽病二日反躁

陽氣蓄微。故雖中風輕邪而達逆。

反發其背而大汗出

是常用大青龍湯之症。而反以發取背汗。故論

虛邪不

大熱入胃

火。大當作胃中水竭。躁煩。

至此始加煩字。必發譫語。

段落

十餘日

故津液振慄。三焦始通。陽氣漸行。

自下利者

津液復。陽氣還。腐穢去。

此為欲解也

故其汗從腰已下

不得汗。

唯髮背故。

欲小便不得

下邪不解。反嘔。

因上逆也。

欲失溲

下邪不解。

大便

下邪不解。

小便當數

而反不數及不多。

津液復入。

大便

已。

經十餘日。津液復。陽氣還。腐穢去。即前所謂自下利者也。

頭卓然而痛

氣下流。其人足心必熱。

穀氣下

流故也

津液復。

○太陽病中風

經亦至。

以火劫發汗

邪風被火熱。

其身發黃。

陽盛

雖中風輕邪。亦被火熱。則血氣流溢。

血氣流溢

失其常度。

兩陽相熏灼

邪熱與火熱相熏灼。

其身發黃。

陽盛

兩陽相合。

則欲飲

血氣流。

陰虛則小便難

陰陽俱虛竭。身體則枯燥。

但頭汗出。

腹滿微喘。

劑頸而還。

汗之有無。若因邪則何必劑頸。今劑頸而還者。是身體津液乾燥而無。

腹滿微喘

虛陽不能。

口乾咽爛

表液乾。

久則譫語

虛陽不能。

或不大便

裏液乾。

久則譫語

甚者至噦。

胃中乾燥甚。

手足躁擾。

神氣不守。

捻衣摸床

神氣無所依故也。

○傷寒脈浮

此經日久。而正邪俱衰之症。似上篇所論脈浮之人。

醫以火迫劫之

亡陽。

取汗過多。

必驚狂

陰陽大虛。神氣不能安舍。且火熱時攻。

起臥不安者

桂枝去芍藥

加蜀漆

牡蠣龍骨

救逆湯主之。

雖有桂枝之名。而意不在解肌。唯是為救火逆。

桂枝去芍藥

加蜀漆

牡蠣龍骨

救逆湯方。

去芍藥而為桂枝甘草湯意以補表虛。牡蠣龍骨救逆湯方。

去芍藥而為桂枝甘草湯意以補表虛。

桂枝

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

龍骨救逆湯方。

去芍藥而為桂枝甘草湯意以補表虛。

桂枝

三兩

甘草

二兩

生薑

五兩 龍骨 四兩

大棗
枚十

蜀漆

右爲末。

據前法考之。唯須末牡蠣龍骨二味。

以水一斗二升先

煮蜀漆減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。○形作傷寒。症是脈非。其脈

不弦緊而弱。是帶絳字。即弱者必渴。邪斯候。陽斯復。則脈弱而渴。是初方正相爭之時。亡津液故也。如此者當最忌火攻之。被火

者必讖語。津液益乾燥火熱佛騰心血。弱者發熱。脈浮弱者。是中風。當自發熱。特插此句者其不弦緊而弱者。有疑虛寒之脈故也。脈浮解之。

此四字示常法之言也。亦更插此句者。以明前曰弱者尋經而卽是中風厥也。

當汗出愈。

以張察之。其症亦當自退也。消息數日。飲食漸多。津液漸復而自汗出則其病必應愈。

○太陽病以火熏之不得汗。邪無從出。其人必躁。陽氣爲邪所逼。不得出而鬱者。又加火熱。故至作躁。到經不

解以火邪入血分故也。
必清血。陰虛陽盛。發至便血。
名爲火邪。下血者。不可曰。是。故曰火邪。
○脈浮熱甚。

反灸之此病又加實此為實實以虛治虛法。并止下利等是也。因火而動動經也。必

咽燥唾血咽二乾三等血是兩陽相熏灼故也。○微數之脈微爲血虛數爲邪實慎不可灸因火爲邪則爲

煩逆皆因火誤 追虛逐實逐實者熱氣實者加火更熾之也 血散脈中火氣雖微

火微少。內珍有力焦骨傷筋血難復也。○脈浮宜以汗解。明其發汗用麻黃湯也。

重而痺。灸背則陽氣唯旺背。津液隨亦聚背。名火之近也。病。有水逆。有火逆。皆別立名者也。

○欲自解者，必當先頂。陽氣乃有干而解。己復之陽氣可以即之。派孚女即干

出解也。前章拾用藥而愈者。○燒臍令其干。其指臍。臍處皮寒。寒氣入亥起而赤者。

因汗而陽氣違背。然鍼處有寒。故陽
必發奔豚。氣從少腹上衝心者。
下鄉邪未解。今發

桑狹居留于金成故長其處作赤腰狀。

盡上灸其核上各一壯。灸以散外來寒氣。與桂枝加桂湯更加桂二兩。倍推陽之力。以解全體邪風。○

火逆。治誤下灸火者。下之。火逆之人又下之。而作煩躁者。桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。因燒鍼煩躁者。燒鍼則汗出火加如此而若煩躁者。亦此方主之。

二症皆已發火者。又加之以下。一以汗。俱是亡津液之治。故以桂枝甘草龍骨牡蠣湯收斂已散亡之津液。桂枝甘草龍骨牡蠣湯方。桂枝一兩。甘草二兩。牡蠣二兩。龍骨二兩。右爲末。金石骨

膠物不爲末。則無効。以水五升。煮取二升半。去滓。溫服八合。日三服。○太陽傷寒者。加

溫鍼必驚也。太陽傷寒。元陽鬱甚之病。故加者字以別太陽中風及陰症傷寒。此症若以溫鍼徒亡津液。則陽氣亦隨亡。陰陽大虛。神不能安舍。邪氣與火氣。又時侵心而發驚。

也。邪猶在表。所以不至狂。○太陽病。當惡寒發熱。今自汗出。不惡寒。發熱。皆

入深之候也。關上下。以察心。脈細數者。細因虛。以醫吐之過也。一二日。邪在表之時。吐之者。腹

中飢。胃中空虛。故飢。口不能食。咽吐而胸中虛邪。三四日。邪稍入深。吐之者。不喜糜粥。邪乘虛入胃。

於是胸中熱甚。飲食冷食。朝食暮吐。胃中虛冷。所食之穀不化。而在胃口者。久而吐之。以醫吐之所致也。此

爲小逆。○太陽病吐之。雖吐之。而非其症。故邪不解。但太陽病。當惡寒。今反不惡寒。不欲

近衣。此爲吐之內煩也。○病人脈數。數爲熱。熱。謂陽氣。當消穀引食。而反吐

者。此以發汗令陽氣微。膈氣虛。邪因入胃之不得宣暢。遂積成熱。使脈數。脈乃數

也。此數。陽氣爲邪所困。成熱令然者。數爲客熱。客指外來物之辭。不能消穀。以胃中虛

冷。故吐也。陽氣虛邪因入。邪所阻陽氣不行。胃中虛冷。不能消穀。○太陽病。過經十餘日。似大柴胡湯

溫欲吐。似嘔不止。之症。而胸中痛。似心下急。之症。大便反澀。以諸知上二症乃非大柴胡湯之症。腹微滿。鬱鬱微

辨太陽病脈證并治法中

煩，正是大柴胡湯之症。而先此時自極吐下者，諸症皆吐下諸藥之餘力耳。非與調胃承氣所以然者。因吐下。

氣，傷若不爾者，不歷吐下者。是大柴胡湯症。而非調胃承氣湯症也。不可與。不可與調胃承氣湯。但欲嘔，吐氣未止。胸中痛。

吐後胸中津液大乾。因作痛。微瀉者，此非柴胡證。似而非。以嘔故知極吐下也。已瀉矣。理當無嘔。而今有之者，是為吐。

藥餘力可知也。但字以下。再言非調胃承氣湯則不可。○太陽病六七日，邪將實胃之日數。表證仍在，脈微而沉。邪入血

微沉。此表症仍在。而脈忽沉微。似欲結胸者。反不結胸，其人發狂者，邪入血室。心藏為紛。神氣因之失常。以熱在下焦，此

論邪從下焦入者。少腹當鞭滿。邪入血室。下焦不通。則小便自利者，若不利者。其少腹下血乃愈。血下。氣隨。邪乃除。

所以然者，以太陽隨經，隨經從表入膀胱。瘀熱在裏故也。邪氣從太陽隨經入膀胱。於是下焦不固。氣積成熱。遂令血室之血滯。故曰瘀熱在裏。而作發狂。鞭滿二症。此定理也。

抵當湯主之。抵當湯方。經破血。桃仁。水蛭。水蛭三十個。蟅蟲三十個。桃仁二十個。大黃三兩。右四味為末。以水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。不下再服。

○太陽病，身黃脈沉結。少腹鞭。小便不利者。邪入下焦。阻隔腸氣。不能推勝。即是前為無血也。抵當湯不中與。小便自利，其人如狂者，血證諦也。為有血。

抵當湯主之。○傷寒，邪重故雖不經日亦致血症。有熱，少腹滿，應小便不利，今反利者，為有血也，當下之。

之指。不可餘藥。宜抵當丸。抵當丸方。此方或作湯。或作丸。但以不害方意。故本論兩錄之耳。水蛭二十個。蟅蟲二十個。桃仁二十個。大黃三兩。右四味。杵分為四丸。以水一升。煮一丸。取七合。服之。晝時當下血。若不下者，更服。

湯已盡者。故用再字。○太陽病，前章論小便利不利。故此章更細論之。以明少腹滿之故。小便利者，小便利者。以邪

丸未盡者。故用更字。

出表。因推勝肌故也。於是熱氣蒸胃。故渴飲水多。多則留飲。陽氣不能到心下。故轉。以飲水多。必心下悸。小便少者。必苦裏急也。飲水多。而小便不利。則必少腹滿而裏急。

辨太陽病脈證并治法下

篇中問論邪已除而惡向存者。然其意亦自有所屬。則去病字。單稱之太陽矣。陽明亦如此。但少陰病之病字。

移置太陽下。則確當。疑後人錯置。

問曰。病有結胸。邪結于胸。有藏結。邪結于藏。其狀何如。答曰。按之

痛。陽氣不得升散。而實于寸脈浮。脈家。寸以察胸。此症胸中陽氣為邪所抑。故隱而見浮脈。關脈沉。脈家。關以察心下。此症心下陽氣為邪所

塞。故伏而見沉脈。名曰結胸也。何謂藏結。答曰。如結胸狀。飲食如故。邪氣不在胃。時時

下利。藏氣不行。胃中失運化。寸脈浮。關脈小細沉緊。虛且難。名曰藏結。舌上白胎。滑者難

治。陽氣微故舌上不乾燥。此雖有胎而不可攻所以難治也。○藏結無陽證。陽氣不往來寒熱。邪不在三焦皆無邪。陽氣無所鬱。故不煩。舌上胎滑者。不可攻也。○病發於陽。而反下之。邪在表之症。反

則實人。熱入。拒邪於表之熱。因作結胸。邪者欲入。陽者欲出。正邪相拒。病發於陰。而反下之。因作痞。陽氣微者不成熟。故邪難入。所以成結胸者。以下之太早故也。○結

胸者。項亦強。心下急迫。如柔痙狀。項強。下之則和。心下開通。宜大陷胸丸。用丸者

急故也。大陷胸丸方。大黃下熱。葶藶甘遂下水。芒硝。杏仁降氣。白蜜護咽喉。大黃半斤。葶藶半斤。芒硝半斤。杏仁

半斤。右四味。搗篩二味。內杏仁芒硝合研。如脂和散。取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢匕。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更

服取下爲效。禁如藥法。禁如藥法四字未考。

○結胸證。症已嚴未。

其脈浮大者。浮邪仍在表也。大虛也。不

可下。下之則殘邪復入。雖入而其人虛。故不可再用大陷胸之藥。是所以在死法。

下之則死。○結胸證悉具。煩躁者。律液乾燥。

亦死。前章用大陷胸故津液虛。此章雖未用大陷胸。而其人本虛。不堪大攻。又不可他藥。此亦所以在死法也。

○太陽病。雖下之。不太早。亦

浮而動數。邪在表。而津液乾燥之脈。

浮則爲風。太陽中風。

數則爲數。熱自發。動則爲痛。邪在表而津液乾燥。故陽氣

不易行。數則爲虛。陽虛。頭痛發熱。太陽之微盜汗出。是結胸陽明變轉之歧路。自汗將至。此

微盜汗出。症以經日久。津液虛。故稍見陽明症。

而反惡寒者。表未解。故。

表未解也。醫反下之。動數變遲。三脈俱虛。而以

下之故胃中空虛。客氣乘之而動胸膈。於是胸內拒痛。短氣躁煩。所謂客氣即邪氣也。

胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。表裏津液乾燥。且

邪氣迫急。心中懊憹。二陽皆有上諸症也。而結胸者大陷胸湯。發黃者梔子豉湯。

陽氣內陷。心下因鞭。則爲結胸。大

陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發

黃也。是梔子豉湯症也。

大陷胸湯方。大黃六兩芒硝一升甘遂一錢右三味以水六升。先

煮大黃取二升。去滓。內芒硝煮一兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利。止後

服。○傷寒六七日。邪將入陽明之日數。然而正氣充實。人正邪不直易地。反遂成結胸。

結胸。邪結于熱實。熱實于脈沉然。

而緊。律液乾燥令然。

心下痛。按之石鞭者。大陷胸湯主之。熱實則陷胸湯。邪實則承氣湯。自有差別。

○傷寒十餘日。熱結在裏。即結胸也。復往來寒熱者。邪未離少陽。與大柴胡湯。但結胸無大熱

者。大熱。謂大表。謂漫熱。此爲水結在胸脇也。小陷胸湯之症。但頭微汗出者。危迫甚。陽氣蒸頭上者。非大陷胸湯不可除之。

大陷胸湯主之。○太陽病。重發汗。正雖太陽之治而重之故表虛。而復下之。誤治裏虛。不大便五

六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。以上氣胃承氣病。從心下至少腹鞭滿而痛不

可近者。陽氣為邪所困。急。大陷胸湯主之。○小結胸病。邪氣正在心下。則不足言結胸。

按之則痛。邪微故若不按之。則陽氣能自穿達。不作痛。脈浮滑者。二脈大陷胸湯。沉緊反對。此小陷胸湯主之。

小陷胸湯方。黃連推心下除熱。半夏燥水引陽。括蕞實。生降降氣。黃連一兩。半夏半斤。括蕞實大者一右三

味。以水六升。先煮括蕞取三升。去滓。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。○

太陽病。二三日不能臥。但欲起。此心下水結故也。太陽病兼水氣者。小便利。則水去。而病除。此心下必結。脈微弱者。

反微弱。此本有寒分也。而用寒分字者。以其心下結。或係小便利。或係太陽病故也。反

下之。醫見心下結。以爲痞。誤下之。若利止。必作結胸。表熱入作小結胸。未止者。四日復下之。二三日下之。至四日。其利

當止。而未止者。醫恐其結胸。四日復下之也。此作協熱利也。水穀與熱相和而下。因作表裏俱虛之症。○必結之下。復下之之下。皆略也字。唯寒分之下置也字。是其一

句以持括之故也。○太陽病下之。其脈促。熱不入。不結胸者。不胸滿。此爲欲解也。邪微陽實。故雖下之。

而熱不入。微脈浮者。必結胸也。下之脈浮滑者。脈緊者。少陰病。必咽痛。脈弦者。

少陽病。必兩脇拘急。脈細數者。浮變爲細者。陽虛也。故不頭痛未止。脈沉緊者。少陽病。

必欲嘔。脈沉滑者。邪氣乘虛而進。故表熱入胃。暫時裏氣盛。協熱利。脈浮滑者。血分充。必下血。下血。後人之

○病在陽。應以汗解之。反以冷水漬之。若灌之。其熱被劫不得去。冷氣

膚。其熱不得化去。彌更益煩。陽益盛。肉上粟起。表陽鬱行。皮膚陷。意欲飲水。煩故反不渴

者。其欲水。非因胃中乾燥。故不渴。服文蛤散。爲除煩而治此藥。○不論本病。結。若不差者。服文蛤散。不

以表未和又邪與。與五苓散。治本病。寒實結胸。無熱證者。發表者。五苓散。唯邪與水實于心。水留心下故也。下。不兼表者。小陷胸湯或白散。

與三物小陷胸湯。白散亦可服。白散本治出瀉。睡寢裏者之方。今借以治寒實之症。故曰亦可服。文蛤散方。川文蛤。今用之治煩。論阿仙藥療治酒醒也。

文蛤。五兩。右一味。為散。以沸湯和一錢匕。服湯用五合。白散方。桔梗升陽。巴豆下。水。貝母燥痰。桔梗。三分。巴豆。一分。貝母。三分。右件三味為末。內巴豆更於白

中杵之。以白飲和服。強人半錢。羸者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不

利進熱粥一盃。利過不止進冷粥一盃。身熱皮粟。病在陽者。假令其症似不。而發達滯滯之。因反作身。熱皮粟之症。而表邪則猶不解。欲引衣自覆者。發達後。表邪不解。惡寒者。五苓散。不得化去。

若以水漬之洗之。後人代麻字以洗字者。恐誤。當與。而醫猶以為發達不足。而再發達。益令熱劫不得出。當汗而不汗。則煩。此一句。示。假令汗出已。與五苓散。已。腹中痛。汗出小便利。津液乾而或太。今不舉方名者以此症。本桂枝所主故也。

加芍藥。三兩。如上法。如桂枝湯法。○太陽與少陽併病。頭項強痛。

當刺大椎第一間肺俞。二穴。除太陽之邪。肝俞。此除少陽之邪。蓋太陽邪。從上二穴而。去。少陽邪亦向表。故導之肝俞而除之。慎不可

發汗。發汗則譫語。用桂枝。故陽氣大出表。因汗出裏液亦乾。燥。則邪未入胃。亦能一時作譫語。脈弦。五六日。漸將入

譫語不止。續不止。遂成陽。明本分譫語。當刺期門。刺以瀉少陽實。但邪方向裏。故肝俞不足除邪。○婦人中風。持。久相

中風故。發熱惡寒。表。經水適來。得之。之。指。七八日。經水當自止。熱除而脈遲。血虛。入經。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。脈不利。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。

入經。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。

脈不利。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。

脈不利。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。

脈不利。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。

脈不利。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。

脈不利。故。身涼。經脈為客氣所壅。胸脇下滿。如結胸狀。心下因結。譫語者。心虛為熱。

不得。此為熱入血室也。經脈謂之血室。當刺期門，隨其實而瀉之。不飲瀉用藥。攻無疾之地。○婦人

中風七八日。得病七八日。是大凡中風轉少陽之日數。續得寒熱。自惡寒發熱。至往來寒熱。相接續無有身涼之日。發作有時。新見少陽症。

經水適斷者。未盡期而斷者。熱渴之也。此為熱入血室。其血必結。結血。為熱所結而凝。故使如瘧狀。

發作有時。有結瘧。故邪不能悉入經脈。仍在少陽之分。於是見如瘧狀之症。小柴胡湯主之。邪仍在少陽之分。故不得專刺期門。○婦人

傷寒。轉急。不發熱。示初太。經水適來。晝日明了。晝則陽氣盛。則陽氣宣暢。神亦安寧矣。暮則譫語如

見鬼狀者。夜則陽氣衰。則陽氣鬱。此為熱入血室。經水適來。故無犯胃氣。及上二焦

熱行承氣湯。必自愈。因經水適。邪入血室。因經水適。邪去。及柴胡湯。給因下利。邪入裏。又因下利邪去。○傷寒六七日。深於小柴胡

熱微惡寒。支節煩疼。太陽症。微嘔。心下支結。少陽症也。其結者。外證未去者。未可

柴胡。柴胡加桂枝湯主之。似二陽。傷寒五六日。少陽之已發汗。得病二三日之時。已

故表。而復下之。復虛。胸脇滿。微結。其結者。以表虛故也。前章結從小便不利。津液

渴而不嘔。無水故。但頭汗出。身體已枯燥。但頭汗。往來寒熱心煩者。邪在少陽。此為

未解也。表裏已盡之人。恐醫觀以為諸症皆從虛而起者也。故特指此句。以示仍帶邪。柴胡桂枝乾姜湯主之。柴胡桂枝乾

姜湯方。邪位在少陽。故柴胡主之。又合桂枝甘草。傷以散表。又加乾姜牡蠣括蕤根以散裏。柴胡半斤 桂枝三兩 乾姜三兩 括蕤根

四兩 黃芩三兩 牡蠣三兩 甘草二兩 右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎

取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。正氣復。而復服汗出便愈。陽氣益復。津液

○傷寒五六日。少陽之頭汗出。支體皆為邪所困。但頭微惡寒。手足冷。二症皆陽氣

微結故也。

下滿。陽氣不能達表。故實于心下。

口不欲食。邪未入胃。故腹中不甚惡食。

大便鞭。津液乾。

脈細者。蓋小細沉緊。今獨提細者。以少陽

篇中有細脈又其似少陰故也。此章雖未歷汗下。而平素虛弱。其陽微。最似前章。此為陽微結。陽氣之不能四布也。邪氣結之令。必有

表復有裏也。其脈細者。陽微結故也。試以症照之。表裏俱見。蓋純陰不得復有外症。乃知此非少陰也。

脈沉亦在裏也。小細沉緊中。邪在裏。亦字

汗出為陽微。汗出。頭汗出也。陽氣充實人。則能自陳通三焦。汗出而解。若不

應大便鞭。此二症者。此人元虛弱陽微故也。假令純陰結。純陰指少陰病。不得復有外證。悉入在裏。此為半在

裏。半在外也。此症邪正在少陽。脈雖沉緊。症已似少陰。不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。

了了者。得屎而解。此二句者。蓋此人舊虛故難邪去。而向須津液自復而後始得了了。○傷寒五六日。少陽之嘔而發

熱者。通。少陽之嘔。不曰往來寒熱。而曰發熱者。為明邪未全離太陽。柴胡湯證具。且具胸脇苦

滿。不欲飲食等之症。則雖發熱。亦從少陽治法而可也。而以他藥下之。柴胡症仍在者。復與柴胡湯。此雖已

下之。不為逆。柴胡者和法。故雖誤治後。必蒸蒸而振。卻發熱。汗出而解。若心下

滿。而鞭痛者。此為結胸也。熱入。大陷胸湯主之。但滿而不痛者。此為痞。取下多

柴胡不中與之。滿而不痛。以胸膈苦滿及心下急。故插此一句。宜半夏瀉心湯。痞滿心傷所主。今此症歷太陽

瀉心湯。所以用宜字也。乃乾姜復裏。人參生津液。甘草。半夏瀉心湯方。半夏。黃芩

乾姜。人參。三兩。黃連。一兩。大棗。十二枚。甘草。二兩。右七味。以水一斗。煮取六升。去

滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。○太陽少陽併病。此章前章之解也。嘔即少陽

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

症。發熱即太陽症。今不發

說症。故而反下之。成結胸。心下硬。段落○此即心下滿而硬痛之略文也。下利不止。取下多故。水漿不下。

下利不止。熱不鬱者。當不作煩。故插其人二字。今反作煩者。是虛煩也。脈浮而緊。浮太陽脈。裏少陽脈。插而字。以明非麻黃湯之脈。

今以脈察之。邪未離少陽。而復下之。若誤為煩裏邪令然。而緊反入裏。則作痞。緊律液乾燥之陽。當與柴胡湯也。

之。則不能成結胸。乃作痞。按之自濡。但氣痞耳。雖滿而無水。但微陽為邪所壓。而痞于心下也。成○

太陽。實人故用十棗湯。若虛人則用豬苓湯。中風。中風故止痞。若傷寒則必成結胸。下利嘔逆。水甚多。故表邪迫裏則作此症。表解者。乃

可攻之。用十棗湯。即是也。其人。以下。說表解後之症也。表已解則熱熱汗出。發作有時。水阻陽。故令汗出。

有頭痛。水阻陽。令其不能四布。故中風邪微雖有水。而不成結胸。心下痞。中風邪微雖有水。而不成結胸。腹滿引脇下痛。邪雖微而帶水。故

見症如乾嘔短氣。水令然。汗出不惡寒者。再言汗者汗頭痛俱最疑太陽。故結以不惡寒一症。而示上二症。亦非太陽之微。此表解

裏未和也。十棗湯主之。十棗湯方。三物逐水。大棗護咽。芫花甘遂大戟大棗。十枚。右上

三味等分。各別搗為散。以水一升半。先煮大棗肥者十枚。取八合。去滓。內

藥末。強人服一錢七。羸人服半錢。溫服之。平旦服。先食服者。以便于逐水故也。若下少。病

不除者。明日更服。加半錢。服一錢半。得快下。利後糜粥自養。○太陽病。醫發汗。

蓋用麻黃湯。然不知藥少病不愈。反自以為誤治。而遂用下劑若燒鍼。其為當自用麻黃湯故轉治法急。遂發熱惡寒。未發熱之症。得陽而始見熱。因復下

之。心下痞。亡陽人雖下之。而表裏俱虛。陰陽氣並竭。陰氣指溫。陽氣指溫。無陽則陰獨。○陰

指身體髮膚。凡人身陽氣竭。則陰實獨存。即死人也。上陰陽謂氣謂用。下陰陽謂實謂體。復加燒鍼。醫用麻黃湯。見症加。以為治不得法。而遽行燒鍼。表陽益極虛。因

胸煩。不犯裏。故不曰面色青黃。青黃甚也。黃火毒也。膚甲者。使虛。故微陽力不足。難治。今色微

黃。手足溫者。

太陰症。

易愈。

表裏俱虛者死。表虛甚者難治。不甚者易愈。

心下痞。

不因下而痞者。用攻藥則。

按之濡。無水故。

其脈。

痞元虛症。脈當沉。而今浮。故加其字。

關上浮者。

結胸白寸脈浮。今日關脈浮者。痞元虛。其邪之結。低於結胸一結故也。

大黃黃連瀉

心湯主之。大黃黃連瀉心湯方。

邪低且無水。故大黃下邪。黃連降上逆。

大黃二兩 黃連一兩 右二味。

以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫再服。

痞元虛症。不欲大泄下。故不煮服。

○心下痞。

之三

而復惡寒汗出者。

邪侵裏之後。陽氣猶不旺于表。而見此二症。痞元裏虛。今復兼表。故插而復之二字。

附子瀉心湯主之。

表虛故不得已用附子。而痞固不好。故加黃芩。以清解鬱熱。

○以本下之。

雖誤下。而邪未入裏。

故心下痞。

裏陽虛。水留作痞。

傷痞。痞因水。故瀉心湯法。不見效。

不解。其人渴而口燥煩。

表仍有邪有熱。而裏虛津液不潤。故作口燥煩之症。加口字者。以係表熱故也。

小便不利者。五苓散主之。○傷寒。

以大邪後。故裏虛至見以下症。

汗出。

此二字。見解之後。胃中

不和。邪雖解而陽氣虛。故不能化飲食。

心下痞。

有物故乾噎食臭。

食臭。食不化。頑然在胃口。

脇下有水氣。胃中有水。腸中有水。

腹中雷鳴。腸中虛懸。故氣推則作聲。

下利者。

胃陽不生氣。故瀉心湯主之。

○傷寒中風。

誤下作痞。不醫。自爲之。故見痞乃攻。

反下之。

誤用已豆之丸。

其人下利。日數十行。服藥之日。大穀不化。下數十行。

胃中所在之食物。一日下利盡。

腹中雷鳴。心下痞。

客氣上逆。

而滿。乾嘔心煩不得安。

能四布。故作喘乾嘔心煩。插而字者。爲示其因之異也。

醫見心下痞。謂病不盡。復下之。

醫見下後作痞。因與大黃黃連瀉心湯。

痞益甚。

再用利藥下之。裏陽重虛。其少陽之邪隨入故痞益甚。

此非結熱。

非邪結熱實者。

但以胃中虛。客氣上逆。故

使嘔也。客氣。客邪之氣也。虛陽戴邪而上逆。

甘草瀉心湯主之。

再誤利藥。故以甘草乾姜芩芍復裏陽。半夏瀉胃。芩連推心下而除痞。蓋此方主溫而兼攻痞。

○傷寒。

傷寒故難利不止。亦能作痞。

服湯藥。

湯藥。蓋大承氣湯之變也。今書湯藥者。明寒藥虛裏之甚也。

下利不止。

止者。作心下

痞鞭服瀉心湯已。

大黃黃連瀉心湯。功成邪除。

復以他藥下之。

再下之故。津液虛。精神未了。了者。饑餓以爲病不盡。而復用瀉心承氣。

之雙下利不止。

三行寒藥。裏陽大虛。中下二焦俱不守。

醫以理中與之。

見利不止。始覺三行寒藥之誤。因與理中丸。

利益甚。

選陽。而下焦不守。勝陽亦已失職。故下利益甚。

理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。

雖固太陽。赤石脂引禹餘糧到大腸。又兼收斂。

復利不止者。當利其小便。

赤石脂禹餘糧湯方。

赤石脂 一斤

禹餘糧 一斤

已上二味。以水六升。煮取二

升。去滓三服。

○傷寒

見邪傳

吐下後。

後表亦續。然邪未全入裏。

發汗

故雖後。而不爲無效。

虛煩脈

甚微。

入九日。

虛煩脈甚微。此肉死。而若過期至人。

心下痞鞭。

虛陽令

脇下痛。

衝咽喉。

陽氣不得從經脈。但遵大路。

眩冒。

津液未復。陽氣不易行故也。

久而成痿。

津液大虛。幸不即死。卒成痿。蓋經乾之極。至筋枯。

同。

經脈動惕者。

津液未復。陽氣不易行故也。

久而成痿。

津液大虛。幸不即死。卒成痿。蓋經乾之極。至筋枯。

則雖裏陽復。而不能復。

○傷寒

邪本重。故發汗若吐若下。

發汗若吐若下。

傷寒發汗邪已解矣。然邪本重。故稍有侵襲者。醫不知其侵襲之微。虛裏陽不能四布故也。

誤以爲殘邪盛大。而用大承氣。

解後心下痞鞭。

噫氣不除者。

噫氣不除者。

氣噫而痞不除者。以津液虛裏陽不能四布故也。

復代赭石湯主之。

特舉二物之名以示異。旋復代赭石湯方。

旋復代赭石湯方。

旋復花迎胃陽令之通。代赭石鎮壓虛氣上逆。其他如生

姜瀉心湯之意也。

蓋彼未犯下。且胃中不和。甚至作下利。故用

旋復花。

三兩。人參二兩。生薑

五兩。

半夏

半升。

代赭石

一兩。

大棗

十二枚。

甘草

三兩。

右件七味。

以水一斗。

煮取六升。

去滓再煎。

虛人用石藥故再煎。

取三升。

溫服一升。

日三服。

○下復

下字之上。略傷寒發汗之四字。

不可更

行桂枝湯。

邪所在經。故不欲從虛表。

若

前章以汗下。邪解。今若不解而見

汗出而喘。

無

大熱者。可與麻黃杏子甘草石蜜湯。未歷下者。此湯所主。已歷下者。又以麻黃峻瀉也。非正治。○太陽病外

證未除。而數下之。未轉陽明。而遽下之。故遂協熱而利。邪入。熱不支而下利。利下不止。熱利

而不止裏。虛陽上逆。故心下痞鞭。痞。邪塞故鞭。表裏不解者。熱除邪存。是近少陰病。故治從溫胃以除邪之法。桂枝人參湯

主之。桂枝人參湯方。桂枝甘草湯以防表邪入。適中陽以溫裏寒。桂枝四兩甘草四兩白朮三兩人參三兩乾

姜三兩右五味。以水九升。先煮四味。取五升。內桂。以氣成功。故忌久煮。更煮取三升。恐脫

之一溫服一升。日再夜一服。補藥故等○傷寒大下之後。暴復發汗。雖後亦邪

減心下痞。不成結胸者。以邪未全入裏故也。惡寒者。表未解也。示惡寒不不可攻痞。恐表邪復入裏。當先

解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。中風主藥。故曰宜。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。瀉心

曰宜。蓋雖已歷下。而不至大虛。故不中行半夏瀉心湯。○傷寒發熱。不舉惡寒。而舉發熱者。示本虛實也。汗出。發汗不得法。徒不解。

心下痞鞭。表液乾燥。裏陽鬱屈。嘔吐而不利者。邪首入裏。裏弱欲出表。而少陽仍有邪圍。故吐且利。其理猶二陽合病自吐自利者也。大柴

胡湯主之。本章誤下者。故心下急鬱鬱微煩。此章誤汗者。故有痞鞭吐利。蓋津液之亡。自有表裏之別。○病通三陽三陰之辭。如桂枝證。是

太陽。頭不痛。項不強。表已除。故微煩也。寒抑陽。故浮也。此似桂枝脈。胸中痞鞭。寒國海故氣

上衝咽喉。不能四布。故不得息者。肺管不利。此為胸有寒也。寒邪邪也。不直言邪者。以

或宿食。邪所依不一。而皆能阻陽之物。乃泛言寒。以通于諸篇。當吐之。宜瓜蒂散。瓜蒂散元吐宿食在上膈者之藥也。今雖

散。已合治之。別機而後合治之。治謂治紛亂。取一錢匕。以香豉一合。香豉用熱湯七合。煮作

散。已合治之。別機而後合治之。治謂治紛亂。取一錢匕。以香豉一合。香豉用熱湯七合。煮作

稀糜。去滓。取汁和散。溫頓服之。不吐者。少少髮衍一少字。加。加前服也。得快吐乃止。諸

得快吐乃止諸

亡血虛家不可與瓜蒂散。恐竭津液。○病脇下素有痞連在臍傍。藏素津液虛。腸氣不易行。漸作氣痞。

○病脇下素有痞連在臍傍。藏氣傳液虛。陽氣不易行。漸作氣痞。

氣積則遂連痛引少腹。入陰筋者。痞塞則藏益虛。方此時外偶有感冒寒。則其邪之侵入。必先於陽虛之處。於是遂成藏結。諸藏為邪所襲。正氣益不展。

痞塞則藏益虛。方此時外偶有感風寒。則其邪之侵入。必先於陽虛之處。於是遂成藏結。諸藏爲邪所襲。正氣益不繼。

則屈曲鬱閉。不墜隣傍溢及陰
筋。其作癰者。與邪爭也。

此名藏結死。

此爲邪結于藏而死也。非爲痞死。前諸章
皆論痞。故今又舉一種痞。以盡其變。

○傷

此名藏結死。此爲邪結于藏而死也。非爲痞死。前諸章皆論痞。故今又舉一種痞。以盡其變。○傷

寒病。通三陽而論之。故曰病。邪能克表裏。故曰傷寒。其

若吐若下後。雖誤下之。裏陰頗虛。而其人素實。故表邪不得直入裏。

七八日不

若吐若下後。雖譟下之。裏陰頗虛。而其人素實。故表邪不得直入裏。七八日不

解熱結在裏。日久表邪漸迫裏。故表裏俱熱。裏陽積者出表。表亦有邪故熱。時時惡風。以未發汗大表不和。故雖作熱。

故表裏俱熱。裏陽發者出表。表亦有邪故熱。時時惡風。以未發汗大表不和。故難作熱。

亦時時惡風。**大渴。**裏陰虛乏。且表裏俱熱故也。**舌上乾燥而煩。**裏虛表鬱。則口舌最燥煩。口舌之煩。猶五苓散之章之理。**欲飲水數升。**

舌上乾燥而煩。裏虛表鬱。則口舌最燥煩。口舌之煩。猶五苓散之章之理。欲飲水數升。

者。白虎加人參湯主之。歷攻擊。故加人參以補津液。○傷寒蕪初麻黃湯之症。而其無大熱。表熱為邪

歷攻擊。故加人參以補津液。

○傷寒

蕪初麻黃湯之症。而其

無大熱

表熱為邪

所拘。故口燥渴。邪迫少陽。胃中熱甚。心煩。盛于裏之熱欲出表。而津液蓄虛之。背微惡寒者。背者元陽氣之所背。

心煩。盜汗裏之熱欲出表。而津液蓄虛之人。經絡不利。陽氣乃鬱於心胸。背微惡寒者。背者元陽

加之邪氣與表虛
故益不能達。
白虎加人參湯主之。
加入參補津液。令裏陽依之以達大表。前章裏虛表鬱。此章表虛裏鬱。並舉以盡其變。
○傷寒

白虎加入參湯主之。加入麥補津液。合裏陽依之以達大表。前章裏虛表鬱。此章表虛裏鬱。並舉以盡其變。○傷寒

此章論麻黃湯白虎湯之別。以釋前二章。脈浮發熱無汗。此脈症。麻黃白虎俱有之。而加之以惡寒喘則麻黃。以渴欲飲水則白虎。其表不解者。

脈浮發熱無汗。此脈症。麻黃白虎俱有之。而加之以脈緊惡寒。喘則麻黃。以渴飲水則白虎。其表不解者。

指其表者。卽所謂
脈緊惡寒喘也。
不可與白虎湯。
略加人參之三字者。以表裏之
不在人參而在白虎也。
渴欲飲水。
卽前章所謂渴
欲飲數升者也。

不可與白虎湯。略加人參之三字者。以表裏之渴欲飲水。即前章所謂渴

無表證者。表證。所謂脈緊惡寒喘也。此已傷寒則初必有脈浮緊發熱惡寒無汗而喘之症矣。故論麻黃湯則曰已解未解。今論白虎湯則此已是三陽合病之症。不必具太陽傷寒全症矣。

表證。所謂脈緊惡寒喘也。此已傷寒則初必有脈浮緊發熱惡寒無汗而喘之症矣。故論麻黃湯則曰已解未解。今論白虎湯則此已是三陽合病之症。不必具太陽傷寒全症矣。

故曰有
白虎加人參湯主之。此曰加人參。以明導前章意。
○太陽少陽併病。再出故略與字。心下輓。按

此日加入參。以
○太陽少陽併病。再出故略與字。心下鞭。按

二陽并病。故先舉此症。以成篇次。○**頸項強。**邪入少陽。而仍微兼太陽。則必頸項強。專太陽則項強。不強。蓋邪入少陽。則三焦俱閉塞難通。且表仍有邪固。

○項強。邪入少陽。而仍微兼太陽。則必項強。專太陽則項強。不兼。雖邪入少陽。則三焦俱閉。塞難通。且表仍有邪。固。

故陽氣欲升難升。諸經俱滿而至強直。若太陽病。則而眩者。前主頭項強痛論之。故太陽爲主。此主心下硬論之。故少陽爲主。乃

至強直。若太陽病。則而眩者。前主頭項強痛論之。故太陽爲主。此主心下硬論之。故少陽爲主。乃

辨太陽病脈證并治法下

代或字以而字。又去。當刺大椎肺俞。經日久。邪亦漸滿。故治表則裏陽發。慎勿下之。恐傷胃時如結胸二症。

○太陽與少陽合病。二陽為邪所密。胃氣不下。格用瀉心。故特戒之。○太陽與少陽合病。不運。所以不利也。自下利者。太陽陽明合病者。下利。其正症也。少陽合病。則邪未入裏。故不必下利。故與黃芩湯。症急故無變。若嘔者。如太陽陽明合病之理也。故曰除病下之者字。而置利下。化。故曰與。若嘔者。不下利但嘔。此曰若。蓋初日必。故不下利而嘔者。黃芩加半夏湯主之。雖嘔亦尚不難黃芩湯中。黃芩湯方。黃芩。微不得單曰若。黃芩加半夏湯主之。之治法。故曰主之。黃芩湯方。黃芩。微

則少陽之邪隨將入。乃因其邪之動搖。而裏陽微發。發連太陽少。黃芩。三兩。甘草。二兩。芍藥。二兩。而送邪于表。芍藥聚津液。供裏陽微發之用。甘草大黃以養胃。黃芩。三兩。甘草。二兩。芍藥。二兩。

大棗。十二枚。右四味。以水一升。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。類則邪隨入。故不得頻服。○若嘔者。加半夏半升。生薑二兩。○傷寒胸中有熱。此人表液以治法錢錄。為篇次。○若嘔者。加半夏半升。生薑二兩。○傷寒胸中有熱。此人表液

中陽氣不易四達。而又邪從中焦。胃中有邪氣。邪入胃。胃中。而腹中痛。欲嘔吐者。在胃中入胃。故陽不能到胃。胸中益熱。胃中有邪氣。邪入胃。胃中。而腹中痛。欲嘔吐者。在胃中

者。又作嘔。黃連湯主之。黃連湯方。黃連。推胸中熱。則胃口之邪暫開。於是上下之陽氣相痛又作嘔。黃連湯主之。黃連湯方。黃連。推胸中熱。則胃口之邪暫開。於是上下之陽氣相

桂枝甘草補表令陽陽四達。大棗養胃。半夏燥水。黃連。甘草。乾姜。桂枝。各三兩。人參。二兩。半夏。半升。此以胃中為邪所分。乃令水氣緩。故也。黃連。甘草。乾姜。桂枝。各三兩。人參。二兩。半夏。半升。

大棗。十二枚。右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。溫服一升。日三服。夜二服。取已入之邪於表之方。○傷寒入九日。以經日久。故大邪雖解而表虛不少。邪因故令藥不斷於胃中。○傷寒入九日。以經日久。故大邪雖解而表虛不少。邪因

風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。表液本虛。且濕與風併寒。陽不嘔。示邪不在。脈浮虛而痛者。浮。邪不入裏之脈也。經日久而邪解。過半也。桂枝附子湯

主之。桂枝甘草補表虛。附子助陽燥濕。大棗養胃。生。若其人。邪在表而見裏。大便硬。津液乾。小便自利者。已曰小便。要乾燥甚。故特去桂枝加白朮湯主之。和出汗。故津液

小便自利者。已曰小便。要乾燥甚。故特去桂枝加白朮湯主之。和出汗。故津液

小便自利者。已曰小便。要乾燥甚。故特去桂枝加白朮湯主之。和出汗。故津液

小便自利者。已曰小便。要乾燥甚。故特去桂枝加白朮湯主之。和出汗。故津液

小便自利者。已曰小便。要乾燥甚。故特去桂枝加白朮湯主之。和出汗。故津液

小便自利者。已曰小便。要乾燥甚。故特去桂枝加白朮湯主之。和出汗。故津液

小便自利者。已曰小便。要乾燥甚。故特去桂枝加白朮湯主之。和出汗。故津液

今桂附並用。則恐或有微汗出。乃代桂枝以水而專以燥濕。桂枝附子湯方。桂枝四兩 附子三枚 生薑三兩 甘草二兩

大棗十二枚 右五味以水六升。煮取二升。分溫三服。分二升為三。則一服七合。方中多附子。故恐其燥也。

眩。徐徐服之。○此章已曰傷寒。當日寒濕。而曰風濕者。寒濕別為一病名。故恐傷之。而代○風寒字以風字。且傷寒八九日。向次太陽。則其勢已去。經於傷寒可知也。於是稱風亦不妨。

濕相搏。此人雖不歷大病而素虛。故風與濕相搏而入。骨節煩疼。給中曰骨節。則必先煩後疼。是骨節者支體動轉之機。最當淺薄。而今津液乾燥。風濕寒。故氣血凝滯。而作煩。搖掣痛。欲搖之則如有物。不得屈伸。近之則劇痛。汗出。表不和鬱甚。短氣之則又作疼。

濕寒膜。小便不利。表陽不行。且惡風不欲去衣。中風象濕。故惡風甚。或身微腫者。濕多者身見微腫。而固非水病。故腫字上加微字。此章比前章邪深症重。蓋前章者其人素實。但得傷寒且經日久。故漸虛至此者也。而其邪亦稍退。此章其人素虛。故經日未久而候至此者也。而其邪亦漸進。故雖中風而比前章表鬱更甚。

甘草附子湯主之。甘草附子湯方。方意大抵似前方。而此方主甘草者。以其人素虛者也。錢附子者。亦恐有腹敗也。而去生薑大藥者。錢附子者是也。甘草二兩 附子二枚 白朮二兩 桂枝四兩 右四味以水六升。煮取三升。

去滓。溫服一升。日三服。初服得微汗則解。中風未取汗。故服之求汗。然以素虛故又過汗多出而益虛。乃加微字。以戒多汗。

能食。或附見 汗出。藥得食而表發汗出多則津液更燥。裏陽復鬱。復煩者服五合。少服藥。令恐一升多者宜服六七合為妙。向恐腹敗者。微。

○傷寒。見邪勢 脈浮滑。對前章浮滑成實。蓋表邪漸進。結出。表為熱。於是表熱裏寒。其指裏者。蓋指腹內也。裏陽從經絡穿邪而出。故脈作浮滑。今以脈察之。胸中實中。仍有陽氣。非彼裏陽已散。寒邪實之比也。何以知之。以脈與裏又置之太知也。此表有熱裏有寒。此章症見熱。故給熱下有寒。厥陰篇其症見厥。故給厥下有

湯主之。石無藥伏陽。令其滋發。知母清涼滋潤。陳通三焦。融和津液。令裏陽與表熱相合而除寒。白虎湯方。知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合 右四味以水一斗。煮米熟。湯成去滓。以米熟為度。故無

辨太陽病脈證并治法下

三九

已胃中燥煩實大便難是也。

燥者。熱未除津液先虛也。煩者。表液乾燥。裏陽不能依以出而鬱也。實者。邪乘虛入而實于胃也。此邪在少陽之時。

設治處其裏。今少陽邪從得入裏也。乃謂之少陽之陽明。其藥則小承氣湯。蜜煎導之輩。

○陽明之爲病。胃家實也。此書已名以傷寒。主外感而立言。則邪在裏。故獨舉邪之所在。而其症略之。

之者皆知邪犯表。故太陽篇唯舉症。若陽明則邪在裏。故獨舉邪之所在。而其症略之。

○問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。

胃中乾燥。胃陽無所依故出表。於是邪得入裏。不更

衣內實。

邪實于胃。

大便難者。

胃中乾燥。氣在外。

此名陽明也。○問曰。陽明病。外證云何。

論陽明病云云。何等症也。

答曰。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。○問曰。病有得之一日。不

發熱而惡寒者。何也。

蓋弟子曾有治惡寒未止者。以大承氣湯而得陽明病也。首不曰陽明。而單曰惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。師答曰。彼所治者。病者。以惡寒未可全屬陽明故也。適愈者。故今特舉之。以難師論之也。

答曰。雖得之一日。不

得陽明病也。首不曰陽明。而單曰惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。師答曰。彼所治者。病者。以惡寒未可全屬陽明故也。適愈者。故今特舉之。以難師論之也。

○問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居

見症之時。承氣下咽。偶中其邪也。若不與藥而觀之。必惡寒將自罷。而即汗出惡熱也。以難弟子疑。

○問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居

中土也。萬物所歸。無所復傳。

答者所謂陽明者。指胃中。胃居一身中央。故邪皆歸焉。猶地位於天中而萬物歸之也。

始雖惡寒。

二日自止。

陽明病。假令始於惡寒。邪全實胃。則惡寒自止。

此爲陽明病也。○本太陽初得病時。發其汗。

居陽明。而論太陽。故冒本字。發其汗。在太陽之時。故插初字。皆明其治之不誤也。

汗先出不徹。因轉屬陽明也。

藥不徹邪之所

明。此殘邪入裏之症。陽明之輕者也。

○傷寒發熱無汗。嘔。

此太陽傷寒。邪不能食。太陽病。加此一症。而

反汗出漉漉然者。

邪未減。而反汗出者。是邪入裏。陽

是轉屬陽明也。

此邪完而入裏之症。陽明之重者也。此篇舉輕者與重者。以顯太陽篇。中風傷寒並舉之例。

○傷寒三日。陽明脈大。

邪在少陽。則陽氣分在表裏。故其脈小。

邪在陽明。則陽氣全在表。故其脈大。蓋陽氣滿。津液盛。則見脈大。陽氣分。津液乏。則見脈小。其日數皆以三日者。是入陽明者。邪進愈。而留少陽者。此係邪進緩之故也。

脈浮邪在表而緩陽鬱不手足自溫者雖陽微而不至冷蓋發熱者太陽也。雖冷者少陰。今不服藥而能溫。是太陽也。是為繫在太

陰。太陰者身當發黃邪在表。微陽不能破邪。而經日久則鬱而發黃。若小便自利者陽氣出表推勝於故大便利也。以陽氣已出表。是

故不發黃。不能發黃至七八日邪入裏之日數。大便鞭者煩虛人。初雖見陰症。而經日久而陽氣漸復。遂成陽症。為陽明

病也。○傷寒即是前章之病人。轉繫陽明者從太陽進者。法當入少陰。而陽氣漸復。成陽明病故曰繫。其人雖成陽明病其

曰其人。微然微汗出也汗微者。從太陽轉故也。○陽明中風是太陽汗出過多。因轉屬陽明者也。蓋陽明中風者其邪小也。是邪雖已入胃。而以

其小故不足實于胃。陽氣仍半在裏。是以作脈浮腫滿等。口苦津液耗燥。而熱勝則口苦。營衛咽乾津液耗燥。而熱勝則口苦。營衛腹滿津液耗燥。而熱勝則口苦。營衛

微喘胃中之外面邪。故裏陽止。發熱惡寒邪已入胃。故三焦御通利。但胃中脈浮而緊津液虛。蓋

緊虛令然。故插而字別之。是不似太陽浮緊之脈。外邪令之如是之也。若下之則腹滿津液大虛。裏小便難也津液已虛。故陽氣不得

出表。而推勝於胃。乃小便難出。若此而加藥者為不治。○陽明病若能食名中風邪小故雖入胃而不能實。其不能

食名中寒邪實胃。胃陽盡出表。胃中無宿穀之陽。故不能食。此即太陽病所稱傷寒者也。凡風

法不能入胃。但以侵表為極。故太陽為中。陽明無有中風。而間有之者。皆引而致者也。非邪之本分。故不須別立名。○陽明病若中寒後人以中寒。誤為後世所謂

虛中者。故胃若字。不能食小便不利陽明中寒。小便當利。而不利者。其人陽微。不足充表故也。手足微然汗出自

不獨身者。亦陽以不充表故也。此欲作固瘕胃中無陽。乃水穀不分而下利。固圜固也。必大便初鞭後

溏四支熱。故初頭硬。胃中冷故後必溏。所以然者以胃中冷水穀不別故也。○陽明病也。欲食

小便反不利陽明病。小便當利。而反不利者。以陽明復津液還入胃中故也。大便自調大便本鞭之症。因津液漸復。而得

虛候。其人骨節疼陽明反從表解。故曰其人。其骨節疼者。裏陽解邪也。翕翕如有熱狀奄然發狂裏陽之表發。路遠難速出。

故其微者。卻。微然汗出而解者。邪從表解。故。此水不勝穀氣。穀生津液。與汗共併。又動心血。

寒與汗共。脈緊則愈。小便不利。大便自調者。若脈遲則不。○陽明病。欲解時。從申至戌。併出。

上。前章論能食陰陽新復者。此章舉自愈者。○陽明病。不能食。亦以爲。攻其熱。下之也。是篇什次序也。他篇舉自愈時者。作此例。

必噦。噦。噦而後發。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。故。得重中者。以。攻其熱。必噦。噦。噦而後發。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。故。得重中者。以。攻其熱。

必噦。噦。噦而後發。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。故。得重中者。以。攻其熱。必噦。噦。噦而後發。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。故。得重中者。以。攻其熱。

用飽。前章用飽而得愈。今難用。飽則微煩。中風裏固有。熱微故無煩。頭眩。微煩爲食所。飽者。胃陽微而不能化也。

必小便難。至作頭眩。則裏陽微。小便乃難。此欲作穀疸。微煩與穀氣。不。雖下之。尋常中。可下。下之則腹滿。小。腹滿如故。中風固有。所以然者。熱微煩。脈遲故也。○陽明病。

中寒。法多汗。邪入裏。陽出表。表陽引胃中之津。反無汗。其身如蟲行皮中狀者。津液縈至皮下。而。此以久虛故也。加久字者。明其。○陽明病。反無汗。表液乾燥甚。

而小便便利。陽出表。推勝脫。故小便便利。此陽明正。二三日。陽明之後。嘔。存于裏之陽氣。經。症。而無汗者非正症。故插而字以別之。

表液乾燥。故不。而咳。表液乾。手足厥者。表液乾燥。裏陽。必苦頭痛。表液乾燥甚故。能出而上升。

不嘔。手足不厥者。頭不痛。痛因表液乾。○陽明病。但頭眩。頭眩非陽明正。症。故曰但。不惡。寒。頭眩已似乎少陰。是當有惡寒也。而此。故能食而咳。頭眩。咳。皆水瀦裏陽之所。

咽痛。難咳津液仍存。能自救則咽不痛。今津液虛故。若不效者。咽不痛。○陽明病。無汗。咳則作痛。然非如少陰不咳而發痛者之甚也。

亦大陽取汗。小便不利。表液已燥。裏陽難。心中懊懣者。邪入胃。胃陽欲出表而表。身必發。多者也。故不推勝脫。

辨陽明病脈證并治法

四三

辨陽明病脈證并治法

黃。熱熾。津液乾。小便不利。乃表邪甚。

○陽明病被火。

太陽發汗過多。轉屬陽明者。發汗額上微汗出。以爲表邪仍不解。用火復發汗。

表已虛。無汗可取而今強實之。故得額上汗。

小便不利者。

雖裏陽已出表而重亡津液。必發黃。○陽明病。中風。

脈浮。

邪令然。而緊者。

陰虛令然也。若夫太陽之浮緊。俱邪令然。今陽明中風則邪虛相搏令然也。故插而字。別太陽脈。

必潮熱發作有時。

邪已入裏。故潮熱。然發作有時者。中風也。異于傷寒之日晡潮熱。

但浮者。

即上所謂浮而緊者也。不言緊者。以非邪令然故也。

必盜汗出。陽明中寒自汗出。今脈

浮此爲中風。其邪小故不能實胃。陽氣仍半在裏。不盜汗乃無自出。但眠則肌膚閉塞。陽乃盛。汗隨出。

○陽明病。

中寒。口燥。表液乾。但欲漱水。含水。欲

不欲嚥者。

寒邪在胃。故惡冷物。

此必衄。

胃邪益結。則表熱益熾也。而表液虛甚。至口燥者。無汗出。故鬱陽難洩乃動經血。

○陽

明病。

所謂脾約者也。

本自汗出。

本。言邪在太陽之時。其自汗出者。桂枝症是也。醫更重發汗。取汗多。病已差。邪已去。尚

微煩。

津液乾燥。裏陽小鬱。

不了了者。此大便必硬故也。以亡津液。胃中乾燥。故令大便

硬。

所謂脾約者也。

當問其小便。日幾行。若本小便日三四行。

桂枝之力。能使陽行于表。故小便利。

今日再

行。

胃已無邪。故表陽還入胃。更引津液于胃中。

故知大便不久出。今爲小便數少。

胃中。故知不久必大便也。○傷寒。

不曰陽明病者。邪未全入胃也。

嘔多。

可攻之。○陽明病。心下硬滿者。

陽氣不出表而偏衛心下者。以其不壯或故也。太陽被誤下者。多作此症。與此同理。

不可攻之。

正邪未全易位。且其陽素虛者。故有此戒。

攻之利遂不止者死。

陰虛少。

利止者愈。

邪去。而表陽還入胃者愈。

○陽明

病。面合赤色。

太陽取汗過多。表液虛。於是正邪難易位。而無津液之可成汗。故陽鬱于表。發赤色。

不可攻之。必發熱。

裏陽欲出難出。故煩。

色黃。

津液乾燥。表益鬱。

小便不利也。

以汗下故表裏俱乾燥。

○陽明病。不吐不下。

會取汗。故表液乾燥。裏陽欲出難出。故煩。

可與調胃承氣湯。

求損裏。致雖有煩。尚可與此方汗吐下而煩者。乾姜附子湯。或梔子湯之輩。

○陽明

病脈遲。邪氣入裏。陽氣出表。雖汗出。不惡寒者。陽明病用桂枝湯之章曰。脈遲汗出多。微惡寒者。表未解也。此章不惡寒者。外欲解之候也。其身

必重。邪氣難活動。陽氣難活動。短氣。邪通迫胃。故氣不暢。腹滿。邪向實胃。裏陽雖欲盡出表而三焦經絡仍有塞。故不易出。乃作滿。而喘。邪入肺。故氣息不利。

有潮熱者。隨時。肌。膚閉塞。此外欲解。可攻裏也。正邪將易位。乃可用。手是微然而汗出者。此大便已鞭也。

自汗從身及手足者。裏陽全出表也。邪已實。胃。則大便成鞭。於是承氣湯可用也。大承氣湯主之。若汗

多者。言未發熱也。微發熱惡寒。微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。不潮者。裏陽未出表故也。

未可與承氣湯。若腹大滿。陽陽為邪所逼。鬱滿甚而不可堪者。少腹其裏。然此不通者。表裏之氣全不通。鬱滿甚者。不得已自舉。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大泄下。大承氣湯方。大黃四兩。厚朴二兩。枳實五枚。芒硝三合。右四味。以水一斗。先煮

胃。厚朴能滿。枳實推胃。芒硝碎結。一二物。取五升。去滓。內大黃。煮取二升。去滓。內芒硝。更上火。微一兩沸。分溫

再服。得下。餘勿服。小承氣湯方。未成燥屎。故去芒硝。殘陽仍在裏。故服之少。大黃四兩。厚朴二兩。枳實

三枚。已上三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯。當更衣。不

下利。而日更衣者。為不令至大泄下也。不爾者。盡飲之。若更衣者。勿服之。○陽明病。潮熱。大便微

鞭者。以熱潮。知裏陽出表。雖微鞭。亦攻之。可與大承氣湯。不鞭者。裏陽未全出表。故律液仍在手裏。不與之。若不大便

六七日。若至七八日。則邪全入裏之日數。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉矢

氣者。小承氣湯轉送燥屎。其氣先泄肛門。此有燥屎。乃可攻之。若不轉矢氣者。此但初頭鞭。後

必澹。屎未成。則難推。其氣先泄肛門。不可攻之。攻之必脹滿。律液已乾燥。故邪難益進。而裏陽不能直出表。鬱而脹。不能食

辨陽明病脈證并治法

也。裏陽雖欲食。而胃口已。欲飲水者。裏陰虛。故引與水則噦。噦者。裏陽不能化水。其後發熱

者。若因經日久。而裏陽能破邪。必大便復鞭而少也。裏陽全出表。而引胃中津液。大便乃

以承氣湯和之。尿少故不須。不轉矢氣者。慎不可攻也。不轉矢氣者。攻之則至腹

初時。○夫實則譫語。太陽取汗。津液已虛者。又裏陽全出表。而煎心。虛則鄭聲。陰陽虛

舍于心。故所映之影。鄭聲重語也。○直視。津液乾甚者。熱復燥之愈則。譫語。前已曰實

故又舉難。難語亦邪重者有至死。所。喘滿者死。表液乾甚。故邪雖入。下利者亦死。表液乾甚。

表邪重者。喘滿下利。脈短是也。○發汗多。若重發汗者。亡其陽。表液乾。譫語脈短者死。譫語

表。傷寒下利。於是上。○發汗多。若重發汗者。亡其陽。表液乾。譫語脈短者死。譫語

乾燥甚。則亦不免死也。○傷寒。大陽之辭。故用。若吐若下。後不解。譫語

邪不解。故表。不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。邪向于。獨語。下

若吐。亡裏液過多。心血亦為大虛。外陽雖煎心。如見鬼狀。心血大虛。神舍不完。若劇者。

發。則不識人。循衣摸牀。神將去。故。惕而不安。如見鬼狀。微喘直視。乾燥

者生。有仍存。○瀉者死。微者。症不劇。但發熱譫語者。乃成陽明症。於是承氣湯

可以。大承氣湯主之。若一服利止後服。不至大泄下。○陽明病。其人多汗。中風。而

人。以津液外出。胃中燥。大便必鞭。鞭則譫語。汗出胃中乾。故雖邪。小承氣湯主

之。譫語。多汗所致。若一服譫語止。更莫復服。中風之邪。小承氣湯足治之。爾後雖經

○陽明病。譫語發潮熱。脈滑。津液未乾。而疾者。裏陽仍盛故也。若夫大承氣湯症。則

故不用大承氣湯。故得也。正邪全易地。故脈變作遲。其遲者。以

無邪之邪。小承氣湯主之。因承氣湯一升。腹中轉矢氣者。已結燥。更服一升。若

不轉矢氣。初之一升。勿更與之。明日不大便。若誤更與之。至明日向不大便者。屬

反微盛者。若承氣力不及而大便不通。則服應益實。今裏虛也。為難治。不可更與承氣

湯也。邪雖在于裏。而其人○陽明病。譫語有潮熱。反不能食者。陽明中風。法

必有燥屎五六枚也。五六枚者多也。是雖中若能食者。但緩爾。燥屎在于宜大承氣

湯主之。燥屎在胃中者。大承氣○陽明病。下血。其脈微。而表液已燥者。裏陽難出表。故

譫語者。此為熱入血室。但頭汗出者。邪未全入胃。表仍有所刺期門。隨其實而

瀉之。不可汗。不可下。乃譫然汗出則愈。刺經風熱。陽氣能活動。此為風也。譫語之作。因津

過多。結燥屎。裏

以有燥屎在胃中。此章解反不能食之章之此為風也。譫語之作。因津

于胸。故定須下之。不用當字。而用須字。文。故然在胃中之三字。此為風也。譫語之作。因津

徒難。語言必亂。乾燥及心血。又裏以表虛裏實故也。表液益虛。燥屎下之則愈。

宜大承氣湯。中風用大承氣○傷寒四五日。傷寒。指表邪之辭。四

按比二句則當發汗也。然邪脈沈不浮。邪將實于胃。殘陽微甚。即大沉為在裏。

邪入裏。陽出表。而反發其汗。徒攻無邪津液越出。大便為難。表虛裏實。津液虛于表。

久則譫語。至六七日。則心○三陽合病。邪大。故腹滿身重。難以轉側。此二症。即大

謂腹滿身重者。邪入裏。口不仁。陰陽為邪所阻。故神不易應口舌。是邪塞而面垢。汗多則不垢。

七八分。能作此症也。三焦而所作也。即是少陽口苦之甚者也。

但表液濃結。能停垢汚。是津液雖不

譫語也。

熱多故

遺尿

神爲邪所阻。膀胱不守。

發汗則譫語。

津液

則熱益

下之則亡

額上生汗。

裏陽失所依。飛越于額上。

手足逆冷。

裏陽失所依。不足及四末。

故

若自汗出者。

裏陽稍得

白虎湯主之。

發大寒之藥。則鬱陽激發。能與表陽相合。而裏邪若自汗不出者。妄起裏陽。則陽氣消滅而死。是表無援陽之故也。

○二陽

併病。蓋惡寒頭痛潮

熱并見之症。

太陽證罷。已發汗。以治

但發潮熱。

太陽已差。陽明獨存。

手足

汗及手足示太陽

熱汗出。

太陽雖無邪。而汗不至。裏邪者。以

大便難。

胃仍有殘陽故

而譫語者。

邪不實而作

○陽明病。脈浮而

會發汗

下之則愈。

宜大承氣湯。

邪已小。然會發汗津液

○陽明病。脈浮而

緊。咽燥。口苦。腹滿而喘。

以上脈症。似陽明

發熱。

汗出。不惡寒反惡熱。

出表。

邪氣因入裏。

身重。

若發汗。

則燥心憤憤。

津液乾燥。故裏陽

故不復惡寒。

反譫語。

表液乾燥。故裏陽不得

若加燒鍼。

強取汗。則作以下之症。

必怵

惕。

煩躁不得眠。

將用乾姜附子湯四

若下之。妄攻裏。

擊殘陽。則胃中空

虛。客氣動膈。

陰虛。陽失所依。戴邪

心中懊憹。

表液亦已乾燥。故裏陽聚

舌上胎者。

者。惡寒。不可得裏藥。

梔子豉湯主之。

治虛陽

○若渴欲飲水。

陽鬱于

口乾舌燥者。

陽明病。不

作此症者。是以表液乾燥甚。

白虎加人參湯主之。

○若脈浮

發熱。

表液未甚乾。

今裏陽時

渴欲飲水。

水所在邪隨入乃益令水

小便不利者。

猪苓湯主之。

猪苓湯方。

澤瀉利小便。阿膠養胃生

津液。得石澀陰平熱。

猪苓扶苓阿膠滑石澤瀉。

各一

右五味。以水四升。先煮

四味。取二升。去滓。內下阿膠烱消。溫服七合。日三服。

○陽明病。

用猪苓湯之戒

也。特冒陽明

病三字。以明此。汗出多而渴者。不可與猪苓湯。以汗多胃中燥。猪苓湯復利其

小便故也。○脈浮。不胃若字者。浮之。而遲。胃中虛。表熱。表液乾燥。裏寒。邪雖不足

微陽已出表。下利清穀者。四逆湯主之。○若胃中虛冷。不能食者。飲水則嘔

胃中已虛冷。若飲水則微陽被厥而吃逆。蓋此論對猪苓湯之章而發。○脈浮發熱。陽實人。能自破。口乾鼻燥。表熱故乾。律

食者。胃中有殘陽。則飢。裏陽欲四散。而表液乾燥。且邪固故不得直發越。鬱熱而傷。○陽

明病下之。陽明中風。不可用大承氣湯。而反用。其外有熱。表液素虛。故裏陽雖手足溫。雖

至大虛。不結胸。邪已入裏。故雖誤。心中懊憹。虛陽鬱。飢不能食。胃中空虛故飢。然胸

頭汗出者。表液素虛。故陽不。能四散。偏升頭。梔子豉湯主之。○陽明病發潮熱。大便溏。小

便自可。以小便不少。可知。胸脇滿不去者。胃中邪已除。小柴胡湯主之。此症蓋常用

湯也。而誤先用大承氣湯。傷治裏。胃外之邪未除。故復用小柴胡湯。○陽明病。亦屬誤下。而。脇下硬滿。中焦

令不大便。此所。而嘔。胃中殘陽。舌上白胎者。以裏陰已亡。表陽猶。可與小柴胡湯。上焦

得通。服柴胡湯。上焦先通。津液得下。胃氣因和。身微然而汗出解也。身微然而汗出解也

胃陽發達。三焦開。○陽明中風。脈弦。律液。浮。邪國。大。虛。而氣短。表液乾。裏陽鬱。續府

腹都滿。甚。脇下及心痛。陽之所衝。又按之氣不通。鼻乾不得汗。表液乾燥。故

不得發。嗜臥。陽氣不。一身及面目悉黃。津液乾。小便難。律液。有潮熱。表裏不相調。日晡

時時噦。陽氣為邪。耳前後腫。頭是骨。獨耳前後肉多。刺之小差。諸症微除。外不

解。雖上焦已通。而表虛之人。無津液之

病過十日。脈續浮者。

即前所謂。發汗大之得。

與小柴胡湯。

刺之難小。而津液虛乏之人。其陽不能自通三焦。故借藥力以通之。

脈但浮無餘證者。

邪有盡。

與麻黃湯。

雖邪微。而在深。故非麻黃。

則不能發。若不尿。即小便難。

腹滿加噦者。

三焦終不通。

不治。

裏陽失活動者。投柴胡黃芩等寒涼藥。則不及微之反至微之。故不治。

〇

陽明病。自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。

并前數章。皆是津液內竭。陽氣偏勝之症。

雖

硬不可攻之。

以非邪令熱故也。

當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根。及與大

猪膽汁。皆可為導。蜜煎導方。蜜

七合。

一味。內銅器中。微火煎之。稍凝似飴狀。

擾之勿令焦。著欲可丸。併手捻作挺。令頭銳大如指長二寸許。當熱時急

作。冷則硬。以內穀道中。以手急抱。欲大便時。乃去之。猪膽汁方。大猪膽一枚

瀉汁和醋少許。以灌穀道中。如一食頃。當大便出。〇陽明病。脈遲汗出多。

邪入裏。

微惡寒者。表仍有微邪。

表未解也。可發汗。宜桂枝湯。

陽明中寒。向用大承氣湯之症。而表仍有微邪。

故表不從。

故借中風藥。以先除表邪。而後用大承氣湯。

〇陽明病。脈浮。

中風之邪。雖全入裏。而小。故胃中陽仍存。

無汗而喘者。

發汗則愈。

陽明中風。用太陽傷寒之藥。果先治表後治裏。故插則愈二字。以明全愈。

宜麻黃湯。

邪小故雖在裏。而能取之於表。

〇陽明病。

發熱汗出。此為熱越。

表液未甚虛。故裏陽能出表。即是尋常陽明症。

不能發黃也。但頭汗出。身無汗。

本。刺頸而還。小便不利。表液虛。裏陽

渴引水漿者。

陰虛陽

此為瘧熱在裏。身必

發黃。茵陳湯主之。茵陳蒿湯方。

茵陳蒿。通腸胃之膜理。令陽氣易從。梔子清鬱熱。大黃下瘀熱。熱下瘀去。陽氣通則小便利。

茵陳

蒿

六兩。梔子十四枚。

大黃

二兩。

右三味。以水一斗。先煮茵陳減六升。內一二味。煮取

三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。傷主之上略

腹減二字。前後照考。此方當在傷寒七八日身黃如橘子色之章之下。黃從小便去也。○陽明證。症者。喜忘燥屎也。不其人

喜忘者。必有畜血。腸胃之血終有瘀血。則心竅不得靈所以然者。本有久瘀血。本字。久字。

見喜忘不故令喜忘。太陽中風。輪因瘀血而發狂者。彼有尿雖難。初攻邪之時。或汗大便反

易。燥屎傷血絡。瘀血宜抵當湯下之。無少腹滿等症。故更加下之二字。以

○陽明病。亦津液乾下之。陽明中風。誤心中懊憹而煩。下之裏陰亡陽氣失所依。欲出表。

胃中有燥屎者可攻。無燥屎者。梔子豉湯。腹微滿。若殘表之邪。隨下而入初頭硬後

必瘥。胃中仍有不可攻之。若有燥屎者。腹微滿且宜大承氣湯。燥屎兼邪。故謂胃

病人不大便五六日。繞臍痛。陽形煩躁發作有時者。表液已乾。胃中又有燥此

有燥屎。故使不大便也。○病人煩熱。不獨陽汗出則解。鬱陽得汗而散。又如瘥

狀。即前章所謂發日晡所發熱者。屬陽明也。或邪或燥屎。皆能令然也。若煩脈實者。宜

下之。脈浮虛者。得。邪在外也。宜發汗。下之與大承氣湯。燥屎兼邪。發汗宜桂

枝湯。如瘥狀。日晡所發熱者。邪近于胃也。當行桂枝二○大下後。亦表虛煩熱人。六七日。

前章唯表虛。乃曰五六日。此不大便。煩。表裏乾不解。邪雖微而猶未解者。以表腹滿痛。宿食

病人。亦表虛煩熱人小便不利。表液乾。且邪阻。故大便乍難。裏陽破邪出表。則津液亦

乍易時有微熱。陽微故熱亦微。邪深故熱時發。喘。邪在表裏俱虛。且邪陷。故神難達。不能臥者。喘故也。有燥屎也。

宜大承氣湯。燥屎兼邪在胃中。○食穀欲嘔者。亦表裏俱虛人也。邪入裏則腐。而腐則力微故不足作嘔。得穀氣而後欲作嘔。屬陽

明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。上焦之塞。非吳茱萸所主也。得溫藥。則胃陽得助。嘔益加甚。屬上焦也。是柴胡之嘔。

而非吳茱萸。吳茱萸苦溫。破胃口之邪。人參助陽生津。生金鼓鐘胃陽。大寒養胃。吳茱萸一升。人參三兩。生

姜六兩。大棗十二枚。右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。○太

陽病。先舉初。而盡其所以變化之由。寸緩。寸以察太表。今脈緩者。邪去表也。關浮。關以察心下。今脈浮者。邪在胃口也。尺弱。尺以察胃中。

氣微之。其人發熱。未至少汗出。表不復惡寒。又以太陽邪去。惡寒難罷。不嘔。少陽亦無邪。但心下

痞者。因誤下。表邪入裏。與虛痞。相拒於心下。此以醫下之也。本中風桂枝症。而以誤下。故致附子瀉心湯症。如其不下者。指緩浮

弱者。若下之。而見此病。人不惡寒。陽氣出而渴者。胃中津液盡。此轉屬陽明也。

寸緩邪去表也。關浮中風入胃也。尺弱胃氣虛也。小便數者。衛氣虛。大便必硬。不更衣十日。無所苦也。正邪俱

相爭。故難在胃。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。法者。令胃氣和之法也。渴者。與瀉心湯。痞而無所苦也。

者。水在心下而引飲者也。宜五苓散。自太陽病至下之也。一段。自如其至無所苦也。又一段。示下而然者。與不下而然者。各有治法也。自渴。至散。又一段。示渴之異因也。

○脈陽微。氣分被邪。故邪解後。陽微見。血分不被邪。故陰脈微完。而汗出少者。衛氣漸復。為自和也。汗出多者。邪已解。而衛氣虛。則津液自微。

為太過。前章寸微之解也。○陽脈實。邪在表陽氣盛。因發其汗出。多者亦為

太過。不獨表虛汗偏。太過為陽絕於裏。以發汗故津液出表。陽氣不能獨留于裏。亦出表。卻乾其胃。成燥屎。亡津液。大便因

硬也。○脈浮而芤。浮為陽。芤為陰。津液虛。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。

胃陽失津液。變成熱。○跌陽中。以察胃。脈浮而瀋。浮則胃氣強。津液乾燥。故其陽化之用絕。○跌陽中。以察胃。脈浮而瀋。浮則胃氣強。故其陽化之用絕。○跌陽中。以察胃。脈浮而瀋。浮則胃氣強。故其陽化之用絕。

數。津液乾燥。故陽氣不易。浮瀋相搏。大便則難。其脾為約。麻仁丸主之。麻仁丸

方。小承氣湯下大便而瀉熱。麻子仁丸。麻子仁二升。芍藥半斤。大黃一斤。厚朴一尺。枳實半斤。芍藥聚津液。杏仁降虛陽。

杏仁一升。右六味。為末。煉蜜為丸。桐子大。飲服十丸。以飲送。日三服。漸加以

和為度。不至泄。○太陽病二日。亦中。發汗不解。表邪未盡解。蒸蒸。津液乾燥。內結燥屎。不得在裏。發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。○傷寒吐後。吐得法。而腹脹滿

者。因吐而津液乾燥。結燥屎。且行。與調胃承氣湯。吐之後。陽氣上逆。令腹脹滿。○太陽病。若

吐若下。若發汗。津液已微煩。津液已虛。且小便數。大便因硬者。與小承氣湯。和

之愈。無盜表之陽。故不可下之。○得病。一二三日。脈弱無太陽柴胡證。表氣蓄虛。故邪

三日已無桂枝症。煩燥心下硬。中風之邪入胃。裏陽欲出。至四五日。雖能食。以承

氣傷。表氣蓄虛。故雖中風。而難用麻黃湯。少少與微和之。令小安。先治。至六日。全入胃之。與承氣湯一

升。給用大承。若不大便六七日。小便少者。雖不能食。但初頭硬。後

必澹。未定成鞭。攻之必澹。須小便利。陽氣盡出表。尿定鞭。乃可攻之。宜承氣

湯。傷寒六七日。已入陽明之日數。而不

無表裏證。表邪欲入裏。而裏氣實。不得入。大便難。身微熱者。其人元實。故經絡邪

為實也。表裏俱無邪。故見症亦不多。宛似陰

急下之。經絡為邪所結。表裏之陽氣不得活動。乃恐

動。而後擊邪。其猶在經者。抵當湯也。其已入胃者。承氣湯也。宜大承氣湯。○陽明邪已屬陽明。而所病反發熱汗

多者。其人衝氣滿。故陽氣出表。則消散不住。故表不蓄。急下之。小續則表陽消散盡。雖宜

大承氣湯。中風中寒。皆有此症。故用承氣湯。曰宜。○發汗津液乾。不解。發汗不得法。故表邪不解。腹滿痛者。津液乾

表邪未解。故裏陽不得出。而滿痛。其理似太陰之腹滿痛也。而彼陰症。故用桂枝加

大黃湯。此裏陽未甚虛。而表液之乾燥反甚於彼。故不用桂。先急裏裏。故其滿痛。急下之宜

大承氣湯。○腹滿不減。承前章之減不足言。已裏裏。裏陽衰。故雖滿痛微減。而當下

之。在裏之邪。下之當然之治法也。而宜大承氣湯。○陽明少陽合病。必下利。二陽俱

已罷急下。故再下雖緩而可也。其脈不負者。順也。肝木乘脾土。順也。負者失也。失者。失少陽

之。在裏之邪。下之當然之治法也。而宜大承氣湯。○陽明少陽合病。必下利。二陽俱

已罷急下。故再下雖緩而可也。其脈不負者。順也。肝木乘脾土。順也。負者失也。失者。失少陽

之。在裏之邪。下之當然之治法也。而宜大承氣湯。○陽明少陽合病。必下利。二陽俱

已罷急下。故再下雖緩而可也。其脈不負者。順也。肝木乘脾土。順也。負者失也。失者。失少陽

之。在裏之邪。下之當然之治法也。而宜大承氣湯。○陽明少陽合病。必下利。二陽俱

已罷急下。故再下雖緩而可也。其脈不負者。順也。肝木乘脾土。順也。負者失也。失者。失少陽

之。在裏之邪。下之當然之治法也。而宜大承氣湯。○陽明少陽合病。必下利。二陽俱

已罷急下。故再下雖緩而可也。其脈不負者。順也。肝木乘脾土。順也。負者失也。失者。失少陽

之。在裏之邪。下之當然之治法也。而宜大承氣湯。○陽明少陽合病。必下利。二陽俱

已罷急下。故再下雖緩而可也。其脈不負者。順也。肝木乘脾土。順也。負者失也。失者。失少陽

之。在裏之邪。下之當然之治法也。而宜大承氣湯。○陽明少陽合病。必下利。二陽俱

已罷急下。故再下雖緩而可也。其脈不負者。順也。肝木乘脾土。順也。負者失也。失者。失少陽

身目爲黃。所以然者。以寒濕在裏。不解故也。以爲不可下也。於寒濕中求之。當於症候尋篇中求治法。○傷寒七八日。歷發汗清解。而邪已解。然津液乾燥甚者。身黃如橘子色。小便不利。

表液乾燥。裏陽不得出表。故不推勝脫。腹微滿者。陽氣不能出表。積茵陳蒿湯主之。藥方當在于此。而舉于前者。疑誤也。○

傷寒。傷寒者。表有邪之身黃。津液虛故不可用大黃。發熱者。裏陽能自出。故不至用茵陳蒿湯之症。○

之。梔子蘗皮湯方。梔子黃蘗清熱。甘草和胃生津。梔子一十個甘草一兩黃蘗二兩右三味。以水

四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。○傷寒。表有邪。瘀熱在裏。身必發黃。下。全

與茵陳蒿湯之章同。而彼則以表液乾燥故瘀熱在裏。麻黃連軀赤小豆湯主之。麻黃連

軀赤小豆湯方。麻黃杏仁合以陳表。赤小豆除胃中蠱水。連軀清毒。生梓白皮開鬱氣。生薑鼓舞胃陽。甘草大棗養胃生津。陳水借土氣。故能安胃清鬱熱。麻黃

二兩 赤小豆一升連軀二兩杏仁四十個大棗十二枚生梓白皮一升生薑二兩甘草一兩

已上八味。以潦水一斗。先煮麻黃。再沸去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三

服。半日服盡。

辨少陽病脈證并治法

凡人身者。表裏而已。其間有三焦以通。所謂上中下之三焦是也。風寒之邪自外而內。則無不經夫三焦者。本論以邪踰二焦之時。爲

少陽之位矣。故少陽病。不可汗不可下。但以陳夏三焦爲治法也。蓋邪在太陽日久。津液乾燥。而後始傳少陽。若津液不乾燥者。不傳少陽也。故少陽病。以津液乾燥爲始。若其邪氣

轉入之變化。則太陽篇中已盡之。但表裏外無別有少陽之區域者。則元不足立論也。然少陽之名目。不可全廢。故姑論所以然。以篇次陽明之後。是故少陽厥陰二篇者。此書之拾遺補

闕耳。學者勿嫌篇讀之次第。以爲少陽厥陰。係於陽明少陰。

少陽之病。非邪令然。故口苦咽乾目眩也。津液乾燥。陽氣不得以充目。○少陽中風。輕邪而能入少

燥甚故也。兩耳無所聞。目赤。津液乾燥。陽氣無所依。然陽氣實人。其陽欲強升。遂率血到目。胸中滿而煩者。不可吐

下。表液已虛。不可復亡裏液。吐下則悸而驚。○傷寒脈弦。津液細。邪氣在表裏間而隔。故裏陽雖為邪所阻。而但頭有微發熱者。脈弦細而無頭痛發熱。則似少陰也。有頭痛發熱。而其頭痛。頭。諸陽之所會。

不可發汗。表液不可更亡。發汗則譫語。發汗則裏陽出表。則津液亦隨出表。表益熱裏益乾。則心血為沸騰。此屬胃。治在胃也。其譫語非邪

令然。故不日屬陽明。胃和則愈。表裏相調。津液還入胃。則愈。胃不和。則煩悸。○本太陽病不解。前章皆論津液乾燥。至

此始論邪。轉入少陽者。脇下硬滿乾嘔。非下之而硬滿。非吐之而乾嘔。皆因邪進而然也。不能食。往來寒熱。尚

未吐下。若吐而嘔者。梔子豉湯。下而結胸者。陷胸湯。脈沉緊者。似弦細之理。與小柴胡湯。○若已吐下發汗。

溫鍼。承前章。譫語。因津液乾燥。柴胡湯證罷。此為壞病。知犯何逆。以法治之。○三陽合

病。治在少陽。故篇次于此。脈浮大。上關上。少陽。但欲眠睡。而自收藏。故欲眠睡。目合則

汗。表開則熱。盜汗出。○傷寒六七日。將入陽明之日數。無大熱。邪入裏。陽出表則法當外熱也。今無外熱者。裏陽為邪所圍。不得出也。其人

躁煩者。少陽之邪。圍裏陽。經絡亦塞。故裏陽鬱。作躁煩。此為陽去入陰故也。少陽變成厥陰。○傷寒三日。三

陽為盡。三陰當受邪。其人反能食。不入陰也。而不嘔。少陽症。此為三陰不受邪也。

○傷寒三日。邪愈則三日當達陽明也。今三日而續達少陽者。邪緩也。邪緩者。留少陽不復達。少陽脈小者。少陽者。邪在中間。而表裏之陽氣。為兩斷。

欲已也。○少陽病欲解時。從寅至辰上

辨太陰病脈證并治法。陽氣虛人。感風寒。其邪氣在表者。名曰太陰。

太陰之為病。邪雖在表。而陽氣虛微。不能與邪爭。故作症不多。腹滿而吐。食不下。津液虛。陽氣難以出。加之

能與邪爭。故作症不多。

表。而升咽者。致吐食。雖吐而無覺者。是陽氣微之故也。自利益甚。陽虛人。舊利。今又邪圍。故陽氣失活動。利益甚。然非邪入胃而利。故曰自利。時腹自痛。

以陽氣微。故逆而後始痛也。曰自者。非邪入胃而作痛也。若下之。表邪乘虛而入。必胸下結。

而微。似結胸而微。○太陰中風。四肢。陽之微。自裏始。而及四肢。煩疼。陽氣微。煩疼。是陰病故貴。陽微陰

微而長者。為欲愈。是陰病。故陽微。陰乾燥。然服○太陰病。欲解時。從亥至丑

上。○太陰病。脈浮者。可發汗。宜桂枝湯。○自利。凡人居常大便不瀉者。陽氣微之

故自。不渴者。裏仍微有陽。故津液亦未甚乾燥。屬太陰。以其藏有寒故也。以藏有虛寒故邪氣隨當溫

之。宜服四逆輩。邪不在表裏。故桂枝大黃皆難用。○傷寒脈浮。邪在表。而緩。手足自溫者。溫。示不

也。以邪微故也。繫在太陰。經日久。是當轉少陰。而太陰當發身黃。津液微虛人。邪又在表日久。則表微而當發身黃症也。

若小便自利者。以小便利。知陽出表。不能發黃。陽不鬱故也。此所謂陽明者。至七八日。日久而後始雖暴

煩下利。日十餘行。作暴煩者。以邪入胃。胃陽欲出表故也。作下利必自止。胃陽未甚虛之

而正氣。以脾家實。繫在發黃。暴煩。皆脾陽實故也。腐穢當去故也。腸胃中之邪氣○本太陽病。醫反

下之。前章表微先虛。裏未甚虛之症也。此章裏微先虛。表未甚虛之症也。以反對成篇次。因爾腹滿時痛者。下之故虛陽屬太陰

也。裏虛而邪在表。桂枝加芍藥湯主之。胃陽欲出表而難出。故作滿且痛。此方加芍藥者。為引表之津液。而聚于裏也。○大

實痛者。裏陽鬱閉急故加大黃救之。急下之症。則表微乾燥甚。故強用桂枝。則陽氣益鬱閉而死也。桂枝加

大黃湯主之。○太陰為病。脈弱。胃氣弱。故其人續自便利。自未得病時。至得病日

不可偏言。故設當行大黃芍藥者。宜減之。以意酌之。以其人胃氣弱。易動故也。

辨少陰病脈證并治法

陽氣虛人。感風寒。其邪氣在裏者。名少陰病。

少陰之爲病脈微細。

微陽已出表。無自裏推。故微細。

但欲寐也。

正邪易地。無相爭。且其人罷微。故欲寐也。但坐。但欲眠。但欲寐。

皆加但字者。以人入尋常所有故也。

○少陰病欲吐。

裏陽未盡出表。

不吐。

微故。

心煩。

表亦已虛。故裏陽雖生不能宣布。而鬱於胸中。

欲寐五六日。

邪已過三焦之日數。

自利。

邪過三焦而達。則陽無所出。則取路於大腸而下。於自利者。正氣徒下。邪氣尙存之辭。而渴者。表液已乾。裏液亦因利乾。

但有微陽鬱胸。故渴。

屬少陰也。

邪氣過三焦。則爲少陰。

虛故引水自救。

自救津液。

若小便色

白者。少陰病形悉具。

邪氣入胃。陽氣出表。小便因利。然微陽不能制水。

小便白者。以下焦虛有寒。

下焦。故陽氣不至。

不能制水。故令色白也。

○病人脈陰陽俱緊。

津液乾燥。陽氣仍存之脈。反汗出者。

亡陽也。

衛氣本虛。故汗漏。陰陽虛。成少陰病。

此屬少陰。法當咽痛。

表液乾。而復吐利。以汗漏。裏亦虛。故不得出而吐利。

出表而表已乾燥。故不得出而吐利。

○少陰病。欲吐。

津液乾燥。故咽不利。

而下利。

陽不得出。表故也。

譫語者。被火氣劫故

也。陰陽本不和者。又加火氣。故津液益乾燥。火熱沸騰心血。

小便必難。以強責少陰汗也。

少陰當小便色白而利也。今難出者。以強取汗故也。

○少陰病。脈細沈數。

略微字。細陽微也。沉。邪在裏也。數。津液乾燥。陽氣欲出難出也。

病爲在裏。不可發汗。○少

陰病脈微。不可發汗。亡陽故也。陽已虛。尺脈弱瀋者。

表已虛則裏亦虛。

復不可下之。

已曰不可發汗。恐人或疑下之症。故復戒之。

○少陰病。脈緊。

血液乾燥。邪在裏之脈。

至七八日。

邪微。故自下利。

邪入胃。

胃陽虛弱。與邪俱下。

脈暴微。

手足反溫。

雖下利。表陽發存。

脈緊反去者。

下利。津液乾燥。理當脈緊。而反去者。邪除也。

爲欲

解也。雖煩下利。

邪漸迫。則裏陽欲出表。而作煩。其邪病者。俱邪下。

必自愈。

煩。下利。雖加症而反是吉候。

○少陰病下利。

陽氣從裏亡。可

若利自止。

邪盡利止。

惡寒而踰臥。

裏陽極虛。不足溫表。而惡寒。是裏表邪隨裏陽之惡寒。

手足溫者。

陽氣從裏亡。可

可

陽氣從裏亡。可

可

治。雖陽氣微長。而邪已除。故可施治。○少陰病。惡寒而踰。亦以下利。而時自煩。下利裏虛。陽氣欲出表。而表亦虛。故不易出。

因作煩。其以非邪國。故曰欲去衣被者可治。邪盡陽虛。故可施治。○少陰中風。雖入胃。而邪

邪。脈陽微陰浮者。為欲愈。津液漸復。故雖微陽。○少陰病。欲解時。從子至寅上

○少陰病。吐利。邪氣迫。陽氣微不。手足不逆冷。邪因吐利而盡。裏陽出表也。反發熱

者。不死。雖吐利。陽氣仍不。脈不至者。吐利後。雖陽一日雖得出表。而津液本虛。灸少陰七

壯。以灸引。○少陰病。八九日。當全入胃。一身手足盡熱者。邪氣入胃。陽氣欲出表。而表

身。以熱在膀胱。經。必便血也。熱從經。○少陰病。但厥。表虛乾燥甚。陽

強發之。以藥發之。故不。必動其血。未知從何道出。或從口鼻。或從目出。是名

下厥上竭。陽氣自不至者。先從下厥。為難治。○少陰病。惡寒身踰而利。手足逆

冷者。陽氣從裏竭。不治。○少陰病。吐利躁煩。煩躁甚者。○四逆者死。四逆逆冷。○少

陰病。下利止。邪氣與津。而頭眩。虛陽欲出表。而表虛乾燥。時時自冒者死。陰陽斷絕。

也。有時時自之三。○少陰病。四逆惡寒。而身踰。脈不至不煩。裏陽已。而躁者

死。神不守。○少陰病。六七日。邪將實胃。息高者死。虛陽不盡出表。而升散盡由咽喉。

少陰病。脈微細沉。邪侵胃。故陽牛出。但欲臥。陰虛。陽微。汗出。新氣本。不煩。汗出。故陽

自欲吐。陽氣欲出。至五六日。邪滿三焦。自利。汗出津液乾燥。故陽陽不。復煩躁。因。不得

臥寐者死。汗出故表虛。自利故裏虛。○少陰病。始得之。邪始侵胃之時。反發熱。陰虛

發熱。而今能發熱者。脈沉者。陽氣微。且邪圍之。故令脈沉。但表液未甚。以表液未甚虛故也。麻黃附子細辛湯主之。麻黃附子細辛湯方。邪深。故用麻黃。微行陽。細辛。故用細辛。陽微故用附子。麻黃二兩。細辛二兩。附子一枚。右三味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內藥煮。取三升。去滓。溫服一升。日三服。〇少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草湯。微發汗。方中無細辛。故特曰發。以指示微取於表。未下利。故津液未盡。故微發汗也。麻黃附子甘草湯方。津液微乾者。用細辛。則恐發煩。故代之以甘草。麻黃二兩。甘草二兩。附子一枚。右三味。以水七升。先煮麻黃一兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。〇少陰病。得之二三日以上。麻黃附子湯。微發汗。雖經數日。而不至下利者。以邪勢不急。故也。是所以裏陽得津液則能自除邪也。心中煩不得臥。邪之所在。用煎草。而但以經日久。故津液尤乾燥。作煩。黃連阿膠湯主之。黃連阿膠湯方。聚津液。雞子黃阿膠生津液。此症所以不用附子者。乾燥甚而煩也。蓋此方本瀉心湯而加鹹者。與葛根黃連黃芩湯乾姜黃連黃芩湯等。相為表裏。黃連四兩。黃芩一兩。芍藥二兩。雞子黃二枚。阿膠三兩。右五味。以水五升。先煮三物。取二升。去滓。內膠烱盡。小冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。〇少陰病。得之二三日。口中中和。胃中無鬱陽。而有水。其背惡寒者。胃中已無鬱陽。是當陽在表。當灸之。背惡寒。灸之當愈也。然裏陽已衰微。雖外用灸引之。而不足充背。故內用附子以助陽。附子湯主之。附子湯方。附子助陽。茯苓白朮利水。人多生津。以長。附子二枚。茯苓三兩。人參二兩。白朮四兩。芍藥三兩。右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。〇少陰病。身體痛。手足寒。邪氣入胃。陽氣出表。然陽本微。故不惡寒身。乃

手足骨節痛。裏陽雖出表。而表液乾燥。且濕氣在表阻陽。故骨節身體皆有痛。脈沉者。邪在裏。附子湯主之。○少陰

病。下利便膿血者。裏液下利。繼以血。桃花湯主之。桃花湯方。赤石脂固腸。乾姜復陽。粳米

故也。方名取於赤石脂。赤石脂一斤。乾姜一兩。粳米一升。右三味。以水七升。煮句米令熟。去

滓。溫服七合。已曰溫服。後又曰內赤石脂末。方寸七日三服。若一服愈。餘勿

服。石藥故服法加丁寧。○少陰病。二三日。至四五日。腹痛。津液乾燥。腸氣欲出。不得出。因作痛。小便不利。表

極乾燥。裏陽不能出表故。下利不止。腸氣全不能出表。故所下利不止。便膿血者。桃花湯主之。○少陰病。下利

便膿血者。可刺。熱在經絡。故刺法亦可。蓋前章者乾燥極。故不可刺。若前章則以日後。故鍼藥皆可行之。○少陰病。吐利。邪迫裏

表液乾燥亦已甚。故陽氣不能出表。乃吐利。手足厥冷。陽氣未出。故欲死。因吐利而津液亡。裏陽失所位。欲出表。益急。

吳茱萸湯主之。吳茱萸溫胃除邪。又開心下。人參生津回陽。生薑散胃。大棗養胃。○少陰病。下利。裏液亡。咽痛。津

乾甚。故陽氣聚于上部。胸滿。虛陽不聚于上部。心煩者。表裏皆乾燥。故陽氣滿胸。猪膚湯主之。猪膚湯方。邪已除。唯乾燥

猪膚一斤。右一味。以水一斗。煮取五升。去滓。加白蜜一升。咽痛故白粉五合。熬

香和相得。猪膚有腥氣。故加熱米粉。令藥升香。溫分六服。加米粉。故其量難知。○少陰病。二三日。邪未盡入裏。咽痛

者。不得出表之陽。一向上升。且咽最欲潤澤之處。而乾燥甚。故作痛。可與甘草湯。甘草和表裏。生津液。令陽氣得以宣達。不差者。與桔梗

湯。裏陽微而甘草不能自達者。加桔梗以助之。甘草湯方。甘草二兩。右一味。以水三升。煮取一升半。去

滓。溫服七合。日二服。桔梗湯方。桔梗二兩。甘草二兩。右二味。以水三升。煮取

一升。去滓。分溫再服。○少陰病。咽中傷生瘡。津液乾燥。而虛陽欲出表。故發動經絡。其體者生瘡。即是喉痺。不

能語言。聲不出者。苦酒湯主之。苦酒湯方。苦酒半夏皆鹹。破瘡。於是又加雞卵。以饒肉。半夏十四枚。雞子

一枚。右二味。內半夏著苦酒中。以雞子殼置刀鐮中。安火上。令三沸。去滓。少

少含嚥之。不差。更作三劑。○少陰病。咽中痛。未至成瘡。半夏散及湯主之。半夏

散及湯方。以桂梗湯苦酒湯之間。立方者也。夫桂梗枝皆推陽之物。而桂平桂溫。此症重於桂梗。故代桂以桂。蓋少陰最惡汗出。故不輕用桂。先用桂。至不得已而用桂。半

夏桂枝甘草以上各等分。已上三味。各別搗篩。已合治之。白飲和服。方寸匕。日三

服。若不能散服者。以水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煎三沸。下火。令小

冷。少少嚥之。○少陰病下利。邪入胃。微瀉不得出。表。而別取路於腸。白通湯主之。白通湯方。黃附復

白通湯。人尿開心下之邪。以復瀉。繼接蔥白。通人尿。方名已以白通命之。則其有人尿可知也。又加豬膽汁。傷之人尿。不在加味列。益知本方有人尿也無疑。蔥白四莖。乾姜

一兩。附子一枚。右三味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。○少陰病。下利

脈微者。與白通湯。與白通湯之症也。利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加豬膽汁湯

主之。下利脈微甚。而至厥逆無脈乾嘔煩者。亦發。服湯脈暴出者死。心下煩開。微續。白通湯之主症也。但其症劇。故加豬膽。服湯脈暴出者死。心下煩開。微續。白通湯之主症也。但其症劇。故加豬膽。

者生。白通加豬膽汁方。蔥白四莖。乾姜一兩。附子一枚。人尿五合。豬膽汁一合。已

上三味。以水三升。煮取一升。去滓。內膽汁人尿和令相得。分溫再服。若無

膽亦可用。無膽。即本方白通湯也。乃知二章俱白通湯症。○少陰病。二三日不已。是輕症。二三日當已。而不已者。有水故也。至

四五日。邪通三焦。津液乾燥。故陽氣不腹痛。津液乾燥。故陽氣不小便不利。陽氣不四肢沉重。邪氣水阻疼

痛。津液乾燥。故陽氣不自下利者。因水而利。故曰自。與此為有水氣。其人或欬。或小便利。或

下利或嘔者。真武湯主之。真武湯方。

茯苓白朮利水。生薑附子溫胃行水。芍藥引津液。或致以下諸症。應方後加減法。乃亦是小黃龍湯例。

茯苓

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩

白朮

二兩

附子

一枚

右五味

以水八升

煮取三升

去滓。溫服七合。日三服。後加減法。若效者加五味半斤。細辛乾姜各一兩。

若小便利者。去茯苓。若下利者。去芍藥加乾姜二兩。若嘔者。去附子加生

姜。足前成半斤。○少陰病。下利清穀。

胃陽大虛。

裏寒外熱。

邪在裏。陽在表也。其不曰

曰表者。以陰症之陽氣不足充表也。

裏者指陽膜內。外者指皮膚外。

手足厥逆。

陽氣微。不

外熱故也。其人面赤色。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止。脈不出者。其人以下。藥後人

故誤以為面

裏者指陽膜內。外者指皮膚外。

手足厥逆。陽氣微。不

脈微欲絕。陽氣將

身反不惡寒。

絕。陽氣將

身反不惡寒。

身反不惡寒。

身反不惡寒。

通脈四逆湯主之。通脈四逆湯方。

虛陽將飛越。故

倍乾姜復之。

甘草

二兩

附子

一枚

乾

姜三兩。右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。其脈即出者愈。後

加減法。面色赤者。加葱九莖。腹中痛者。去葱加芍藥二兩。嘔者。加生薑二

兩。咽痛者。去芍藥加桔梗一兩。利止脈不出者。去桔梗加人參二兩。

亦小黃

○少陰病四逆。

邪逆阻三焦。經絡。內外氣不通。於是初出表之陽氣

失根而四逆也。雖按此章原陰虛中之論。蓋備置此。

其人或效。或悸。或

小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。

衛氣不護故泄利。裏陽不推故下重。

四逆散主

之。

四逆散方。

甘草和胃行表液。枳實開心下之邪。柴胡

疏肝三焦。芍藥聚津液。供令陽出表之用。

甘草枳實柴胡芍藥。右四味。

各十分。搗篩。白飲和服方寸匕。日三服。後加減法。效者加五味子乾姜各

五分。并主下利。悸者加桂枝五分。小便不利者。加茯苓五分。腹中痛者。加

附子一枚。泄利下重者。先以水五升。煮茱萸白三升。煮取三升。去滓。以散三
方寸匕。內湯中。煮取一升半。散藥又煮之者。以治下重故也。分溫再服。○少陰病下利。邪氣去。正氣亦衰。

六七日。邪已在裏之日數。是邪在裏。故下利則亦去。欬。津亡。裏陽失所依。欲出表。而表亦乾。燥甚。故傷升咽喉。且帶水故作欬。而嘔渴。有水故阻。虛陽上逆。

而嘔。有水故津液不生而渴。心煩。表裏乾燥。陽氣鬱于胸。不得眠者。猪苓湯主之。除水則陰陽自復。○少陰病得之

一二三日。日淺故陽氣未甚微。然邪勢急。故作乾燥症。口燥咽乾者。裏陽為邪所困急。故胃中為熱。引津液甚。咽喉先知乾燥。急下之。姑先下之。令

裏陽得活動。而後應更謀之。宜大承氣湯。○少陰病。自利清水。色純青。下極則藏府固有之液出。其色青者。變人所謂膽苦汁。

漢人所謂漏底瀉之類。心下必痛。裏陽未全出。口乾燥者。急下之。宜大承氣湯。○少陰病六七日。

邪腹脹。裏陽未得全出故脹。不大便者。裏陽久不得出表。又不急下之。宜大承氣湯。自發者。自發者。發於此章。皆論裏病而表候乾燥極甚者。皆不得已。乃先治裏救其急。○少陰病脈沉者。沉為病在裏。蓋陽而後更謀之。其日愈者。死在須臾。故治法倒行而逆施。

後用承氣湯。若少陰則其人本虛。故邪全入胃則死也。故不違攻邪。先急溫之。保其表陽。及者生。不及者死。陽明少陰其邪位同。而用承氣之機。則有早晚。本論處方之妙。於是乎可觀也。急

溫之。宜四逆湯。○少陰病。飲食入口則吐。邪在胸。心中溫溫欲吐。復不能吐。邪在胸。而胸中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲。水飲兼邪。乾嘔者。不可吐也。故遇此胸中實。不可下也。當吐之。若膈上有寒飲。水飲兼邪。乾嘔者。不可

邪在胸。而胃陽力微。故欲吐。而不能吐。始得之手足寒。欲吐故身背則不覺惡寒。但手足惡寒。脈弦遲者。邪在胸。而胸中實。故欲吐。而不能吐。宜四逆

湯。○少陰病下利。正邪俱衰。脈微。陽虛陰虛。而汗出。表虛。必數更衣。邪衰而向下利者。以衛

氣虛之故也。反少者。初下利。而裏虛已亡矣。故當溫。亦宜用四逆湯。且膈上有寒飲而嘔。故外

氣虛之故也。反少者。初下利。而裏虛已亡矣。故當溫。亦宜用四逆湯。且膈上有寒飲而嘔。故外

氣虛之故也。反少者。初下利。而裏虛已亡矣。故當溫。亦宜用四逆湯。且膈上有寒飲而嘔。故外

氣虛之故也。反少者。初下利。而裏虛已亡矣。故當溫。亦宜用四逆湯。且膈上有寒飲而嘔。故外

以表引陽。內以四逆陽助之。

辨厥陰病脈證并治法

邪氣寒三焦及經絡。而裏陽不得出表。鬱胸者。名厥陰病。邪之所位。同少陽。而厥陰則其人蓄虛。故邪侵不獨三焦。經絡亦寒。故裏陽全失出表之路。於是手足厥冷。胸中之鬱熱。反甚於少陽。

厥陰之爲病。消渴。胸中熱甚。故引津液於胃中。中愈。氣上撞心。邪國極。故心正。心中疼熱。陽鬱甚。飢而

不欲食。胃中無邪故飢。然胸中鬱。故不欲食。食則吐衄。胃中無陽。故食不化。反動。故衄。下之利不止。陽氣一取。路於陽。則正氣隨虛。邪氣隨入。

○厥陰中風。脈微浮。陽氣破邪而出之候。爲欲愈。不浮爲未愈。○厥陰病。欲解時。

從丑至卯上。○厥陰病。亦中風。渴欲飲水者。少少與之愈。得陽散。○諸四逆

厥者。陰全屬之。凡四逆厥。非邪國極。則陽氣竭于內之候。皆非可下之病。不可下之。虛家亦然。雖有風寒之邪。而陽微不足。溫手足者。不可下也。而況於無邪。唯因蓄虛而厥者乎。

○傷寒先厥後發熱而利者。必自止。發熱則陽氣不下。利止。故利止。見厥復利。

○傷寒始發熱六日。厥反九日而利。厥則必利。凡厥利者。當不能

食。胃不和。故。今反能食者。恐爲除中。胃陽除盡。無復上升者。故食入而不知。是名除中。食以索餅。與溫熱之物。以試胃氣。不

發熱者。知胃氣尚在。胃陽尚足。化食。必愈。恐暴熱來出而復去也。胃陽極虛。時得溫熱。食則一旦飛越去。不復續。

後三日脈之。此以下言據脈而預斷之言。其熱續在者。期之。且日夜半愈。所以然者。

本發熱六日。厥反九日。復發熱三日。并前六日亦爲九日。與厥相應。故期

之。且日夜半愈。後三日脈之。熱已九日。而後經三日而脈之也。而脈數。其熱不罷者。熱至十三日。而不罷者有餘也。

此爲熱氣有餘。邪雖已盡。而津液必發。應脈也。厥陰病。邪本優經絡。故熱不消散。則血液腐壞。○傷寒脈遲。

陽虛六七日。厥陰病。經日久。而其胃陽亦益虛微。而反與黃芩湯。蓋見下利與黃芩湯。微其熱。微除胃中。脈遲爲

寒。爲裏寒。今與黃芩湯復除其熱。自脈遲爲寒。至不能食。蓋註解文也。故解微字曰除。亦指解微字曰微也。腹中應冷。當

不能食。胃陽虛微甚則不能消穀。反爲食所挽去。故不受食。又今反能食。此名除中必死。○傷寒先厥後發

熱。下利必自止而反汗出。因發熱之勢。汗出衛氣虛。腹理不守。咽中痛者。汗出表液亡。其喉爲痺。咽中痛。作喉痺。

發熱無汗。而利必自止。若不止必便膿血。發熱則利當自止。而不止者。本表液乾燥甚。故陽氣不能盡出表。急取路於腸而利。

其便膿血者。以利不止裏液亡。熱獨存而血液腐壞之故也。便膿血者其喉不痺。熱氣下泄。故表雖乾燥。而喉不痺。○傷寒一二日

至四五日而厥者必發熱。前發熱者。後必發熱。前熱者後必厥。通厥以熱。熱復以厥。厥深者熱亦

深。言日數多也。厥微者熱亦微。證深。有微者。難淺。有甚者。故淺深微甚。各厥應下之。舉一隅示之。此觀厥知熱。觀熱知厥之妙法。

邪進而至厥者。後必應成入胃可下之症。而反發汗者。邪進入胃。而反攻其表。此誤也。必口傷爛赤。表液乾燥。極則裏陽一

○傷寒病。邪是傷寒。而病字通三陽三陰之辭。厥五日。熱亦五日。設六日當復厥。不厥者自愈。厥

終不過五日。以熱五日。故知自愈。○凡厥者。陰陽氣不相順接。便爲厥。厥

者。手足逆冷是也。後人解厥字義之文也。而本論所謂厥冷。冷自未至本也。逆冷。冷自本及未也。今不論本末。誤解傳謂之逆冷。傷寒脈微而

厥。至七八日。邪甚陽微。建經日久。而厥不愈。膚冷。手足厥冷新甚。及身者。藏府皆冷故也。其人躁無暫安時者。神無所依。此爲藏厥。非爲蚘厥也。藏厥死不治。此章欲論蚘厥者。其人當吐蚘。令病

者靜而復時煩。此爲藏寒。心陽之寒。陽微。故蚘得時入腸。蚘上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。

胃中有蚘。故又煩者。蚘聞食臭出。其人當自吐蚘。蚘厥者。烏梅圓主之。又主

得食而嘔。

久利方。胃中有就則不和而下利。

烏梅圓方。

烏梅蜀椒殺蟲。細辛桂枝推陽。乾姜附子復陽。黃連除胸中熱。黃芩除腸中熱。當歸生血。人參生津回陽。

烏梅

三百細辛六兩

乾姜

十兩

黃連

一斤

當歸

四兩

附子

六兩

蜀椒

黃藥

六兩

右十味

異擣篩

合治之

以苦酒漬烏梅一宿

續以苦酒者。欲不失烏梅酸味也。

去核

蒸之五升。米下飯熟擣成泥。和藥令相得。內臼中與蜜杵二千下。圓如梧

桐子大。先食欲服十丸。日三服。稍加至二十丸。禁生冷滑物臭食等。

腸胃不和。生

就之人。不得復

食難化之物。

○傷寒熱少厥微。指頭寒。

厥微。指頭。止

默默不欲食。

三焦閉塞故也。亦是似少陽之理。

煩燥數日。

表液乾燥。且邪寒三焦。小便利色白者。此熱除也。經日久。而陽氣發破邪出表。欲得

食。裏熱除。欲得食者邪解也。若陽氣出表而尚不欲食者。邪入胃也。陽氣出表之後。以食下胃邪有無。其病爲愈。厥微者邪薄也。故

嘔胸脇煩滿者。其後必便血。

表液乾燥甚。陽氣不得出。而作嘔胸脇煩滿等症。而微不

病者。問者之言。故曰病者。手足厥冷。言我不結胸。

厥則裏陽當

小腹痛。

下焦寒故。按之痛者。此

冷結在膀胱關元也。

冷結。言病冷結下部也。

○傷寒發熱四日。厥反三日。復熱四日。厥

少熱多。

陽勝邪

其病當愈。四日至七日。熱不除者。其後必便膿血。

津液不足。熱

九日久則血液腐壞成膿血。

○傷寒厥四日。熱反三日。復厥五日。其病爲進。寒多熱少。陽氣

退。故爲進也。

○傷寒六七日。日數。脈微。手足厥冷。

邪難進。陽微故未能出表。

煩躁。

邪入

厥陰。厥不還者死。

足出者。死。

○傷寒發熱下利。

發熱則利當自止。而發熱下利俱作者。裏陽暴出盡也。

○傷寒發熱。下利至甚。厥不止者死。

○傷寒發熱。下利至甚。厥不止者死。

○傷寒發熱。下利至甚。厥不止者死。

○傷寒發熱。下利至甚。厥不止者死。

○傷寒發熱。下利至甚。厥不止者死。

辨厥陰病證并治法

六七

六七

六七

六七

六七

六七

六七

六七

六七

傷寒六七日不利。厥而不利者以陽微故也。便發熱而利。邪及入胃而裏陽暴出不止。其人汗出不止者

死。衛氣不固。有陰無陽故也。○傷寒五六日。邪過三焦。不結胸。腹濡脈

虛。邪結裏。而陽微故腹不硬。血虛故脈不實。復厥者不可下。此爲亡血下之死。○發熱而厥。後日難

先舉尋常。七日。至明日則邪應實胃。下利者爲難治。亡血者不可下也。至邪實胃之日而○傷寒脈

促。津液乾燥甚者。裏陽偏從經絡出。故其脈促。手足厥逆者。邪塞密。故陽氣偏入經絡。不周手足。可灸之。裏陽閉塞甚者。以灸○

傷寒脈滑。表裏津液未乾燥者。雖邪塞而厥者。裏有熱也。白虎湯主

之。裏陽盛者。微之以寒。藥。則能自破邪出。○手足厥寒。本折厥冷。脈細欲絕者。血液盡虛。故建

四逆湯主之。當歸四逆湯方。當歸生血。芍藥聚津液。桂枝細辛行當歸 三兩 桂枝 二兩

芍藥 三兩 細辛 二兩 大棗 二十箇 甘草 二兩 通草 二兩 右七味以水八升煮取三升

去滓溫服一升日三服。○若其人內有久寒者。內指胃中。症同前而胃中宜當歸

四逆加吳茱萸生薑湯主之。吳茱萸除胃中寒。生薑散胃陽去水氣。此方○大汗出

熱不去內拘急四肢疼。津液使亡。熱不去。表液乾燥。故厥逆而惡

寒者。表裏俱虛。故惡寒。四逆湯主之。○大汗若大下利而厥冷者。非因邪而厥冷四逆湯

主之。○病人手足厥冷脈乍緊者。邪在經脈之源。邪結在胸中。此當屬心中滿

而煩飢不能食者病在胸中。此當用瓜蒂。當須吐之。宜瓜蒂散。陰病用吐藥。故加之須字。○傷寒

厥而心下悸者。胃口有水。故陽不至。宜先治水。當服茯苓甘草湯。卻治其厥。先治水。不

爾水漬入胃。必作利也。○傷寒六七日。大下後。六七日。故寸脈沈而遲。大下利而尺

皆絕。謂寸脈存者。以陽氣升上故也。其沉者。以陽氣出表故也。其遲者。以陽氣極虛故也。手足厥逆。下部脈不至。若上部脈不至者。或是因邪寒。今下

邪脈不至者。是陽氣竭也。咽喉不利。唾膿血。津液乾燥極者。陽氣泄利不止者。下部脈絕。故無為難

治。麻黃升麻湯主之。已曰難治。當無主方也。若強處方則通脈四逆湯或有效之。其他諸方決

非所能之症也。因按此章有脈沉而遲之四字。故使人誤取面黃陽症之主方。而處

麻黃升麻湯方。麻黃桂枝芍藥甘草發汗石無續桂麻浮越注。升麻上焦寒。當歸養此症。升麻上焦寒。當歸養黃二兩升麻一兩當歸一兩知母黃芩萎蕤各八兩石赤白朮乾姜芍藥天門冬桂

枝扶苓甘草各六右十四味。以水一斗。先煮麻黃一兩沸。去上沫。內諸藥。煮

取三升。去滓。分溫三服。相去如炊三斗米頃。令盡。汗出愈。令盡。汗出愈。服○傷寒

四五日。邪過三焦腹中痛。胃陽虛。水飲不行。且邪盛二若轉氣下。趣少腹者。此欲

自利也。陽氣虛。陽胃不實。風氣因入。○傷寒本自寒下。即前章醫復吐下之寒格。

寒格者。水滯邪在心下。而扞格胸腹間。令陽氣不升降更逆吐下。若食入口即吐。誤吐下。

之病名也。故寒格則必自下利。即是本自寒下之症也。乾姜黃連黃芩人參湯主之。乾姜溫胃復陽。芩連瀉心下。人

參生津乾姜三兩黃連三兩黃芩三兩人參三兩右四味。以水六升。煮取二升。去滓。

分溫再服。○下利。邪亦有微熱。陽氣未而渴。寒去欲解脈弱者。其陽因熱則必見微。今脈

令自愈。如此則下利亦○下利。陽氣以內之邪。脈數有微熱。汗出令自愈。陽氣以外。雖

下利。裏陽得活動。能設復緊。為未解。若數且緊。則雖陽氣活○下利手足厥冷。無脈

三兩黃藥 三兩秦皮 三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更

服一升○下利裏邪腹脹滿身體疼痛者表邪未解故裏陽微出表而裏陽微有表症先溫

其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯補虛故曰溫○下利欲飲水者

以有熱故也白頭翁湯主之○下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯以舊有燥屎

故胃氣不和不能生津液方此時得傷厥陰病其邪固陽急故心血沸作譫語也蓋下利者厥陰病故也其譫語者舊有燥屎故也○下利後更煩按之

心下濡者爲虛煩也煩不因邪者謂之虛煩宜梔子豉湯○嘔家邪已除但熱氣有餘生瘧

令然故有癰膿者不可治嘔膿盡自愈嘔自○嘔因虛陽將飛而脈弱嘔者脈當浮

其嘔也小便復利微陽出表故也身有微熱見厥者微陽不足難治四逆湯主之下利

之章用通脈四逆湯之意○乾嘔吐涎沫邪侵胃口故津液不行留胃口而成涎沫頭痛者涎沫塞中焦故陽氣

傷主之吳茱萸溫胃除邪開心下塞人參生津回陽生美鼓舞胃陽大棗養胃嘔而發熱者能成少小柴胡湯主

之厥陰病陽氣復即少陽病也○傷寒大吐大下之極虛復極汗出者邪已除正以其

人外氣怫鬱復與之水與水微陽而令發汗蓋以發其汗因得嘔所以然者胃

中寒冷故也已大吐下在裏之邪雖除而其表之邪未解於是復與水發汗則表裏俱

傷寒前章之嘔邪除而後作此章之嘔或前章之嘔邪除而後作此章之嘔噦而腹滿裏氣不伸故視其前後視前後之病

何部不利知不利在三焦乎在胃口乎利之則愈